herpy

AGAMER

Southern Tree Agama

Acanthocercus atricollis

Acanthocercus atricollis er en kraftig, trælevende agam fra det sydlige og østlige Afrikas savanner og tørre skove. Hannerne får blåt hoved i yngletiden, og dyrene sidder på grene og stammer og venter på byttet. Der findes kun lidt viden om pasningen: arten kræver et højt terrarie med kraftige grene, en meget varm solplads, UVB og kun én han pr. terrarie.

Familie: Agamidae Tidligere navn: *Agama atricollis; Stellio atricollis; Laudakia atricollis*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**25-35 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Savanne og tørskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 100 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-32 °C**
Hotspot	**38-43 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**11 æg**
Kuld pr. år	**1**
Inkubation	**56-90 dage** ved 26-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Acanthocercus atricollis*. Anbefalingerne bygger på levestedet og dyrets størrelse.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 24-32 °C i terrariet, og solpladsen højt oppe skal have en overfladetemperatur på 38-43 °C, målt med et infrarødt termometer.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal ligge på 30-50 %. Det passer til savannen og til tør skov, hvor arten lever. Terrariet skal have god ventilation, så det tørrer op mellem forstøvningerne.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og skal have kraftigt lys og UVB svarende til Ferguson-zone 3: et T5 HO-rør på 10-12 % i et reflekterende armatur over solpladsen, så UVB dækker den varme halvdel af terrariet.
FODER	*Acanthocercus atricollis* lever af leddyr. I naturen består maden mest af myrer, biller og græshopper. Myrer udgør langt de fleste byttedyr, men det er græshopper og biller, der fylder mest.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Acanthocercus atricollis* er en rolig og iagttagende art, som bruger det meste af dagen på at sidde stille på en gren og følge omgivelserne.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Sydafrika, Eswatini, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambique og Kenya.