herpy

AGAMER

Armored Pricklenape

Acanthosaura armata

Acanthosaura armata er en olivengrøn til lysegrøn skovagam med to par pigge på hovedet og i nakken. Den lever i lavlands- og bakkeskovene på Malaysia-halvøen, i det sydlige Thailand og Myanmar, på Sumatra og på Hainan. Arten bliver omkring 30 cm og er sjælden i fangenskab, så pasningen bygger på de nærtstående *Acanthosaura capra* og *Acanthosaura crucigera*, tilpasset et varmere klima.

Familie: Agamidae Tidligere navn: *Agama armata*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**25-30 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**100 × 50 × 120 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**21-24 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Vanddel** dybde 5-15 cm
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**6-12 æg**
Inkubation	**110-130 dage** ved 25-27 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Acanthosaura armata*, og arten er sjælden i fangenskab.
TEMPERATUR	*Acanthosaura armata* skal have 24-28 °C om dagen og 21-24 °C om natten. En svag varmelampe giver en lille solplads på 30-32 °C højt oppe i den ene ende; dyret soler sig kun lidt, men skal kunne vælge mellem flere temperaturzoner.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden hos *Acanthosaura armata* skal ligge på 70-90 %, højest om natten; tallet er lånt fra slægtens øvrige arter og passer til den fugtige lavlandsskov.
LYS OG UVB	*Acanthosaura armata* er dagaktiv, men lever i skyggen i skoven. UVB er gavnligt; Ferguson-zone 2 er lånt fra *A. capra*. Brug et UVB-rør i et reflekterende armatur over nettet, og lad dyret kunne trække sig væk fra lyset i løvet.
FODER	*Acanthosaura armata* lever af insekter og andre smådyr, og slægten er især glad for orme. Giv en varieret kost af fårekyllinger, kakerlakker, græshopper, biller, larver, regnorme og nøgne snegle.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Acanthosaura armata* er et skjult dyr, der sidder stille på en gren eller på jorden og regner med sin camouflage. Opdages den, stiller den sig op, blæser strubesækken op og åbner munden.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Kina, Myanmar (Burma), Thailand, Malaysia og Indonesien.