herpy

AGAMER

Green Pricklenape

Acanthosaura capra

Acanthosaura capra er en grøn skovagam med en kam af lange pigge i nakken og en torn bag hvert øje, hjemmehørende i de fugtige skove i det sydlige Vietnam og det østlige Cambodja. Den bliver 25-32 cm, lever i træerne og kræver et højt, fugtigt og forholdsvis køligt terrarie, hvor luften aldrig bliver varmere end 29 °C.

Familie: Agamidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**25-32 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**100 × 50 × 120 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-27 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Vanddel**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**6-15 æg**
Inkubation	**110-180 dage** ved 25-27 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Næsten truet (NT)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Et voksent dyr skal have et højt terrarie på mindst 100 × 50 × 120 cm (længde × bredde × højde). Højden er vigtigere end grundfladen, for arten bruger de lodrette flader.

TEMPERATUR

Acanthosaura capra tåler varme dårligt. Luften i terrariet skal ligge på 22-27 °C om dagen og må aldrig blive varmere end 29 °C. Bliver det varmere i længere tid, er der risiko for hedeslag, stress og udtørring.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden skal ligge på 70-80 % om dagen og omkring 90 % eller mere om natten. Sprøjt terrariet grundigt med blødt vand 2-3 gange om dagen, så der hænger dråber på planter og vægge.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv, men lever i skyggen i skoven og har brug for forholdsvis svag UVB. Brug et T5 HO-rør på 6 % (Ferguson-zone 2) i et reflekterende armatur over nettet, der dækker omkring halvdelen af terrariets længde.

FODER

Arten lever af insekter og andre smådyr og er især glad for orme. Giv en varieret kost af fårekyllinger, kakerlakker, græshopper, silkeorme, larver af soldaterfluer, regnorme og nøgne snegle.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Acanthosaura capra er en rolig skovagam, der er sky i naturen, men vænner sig hurtigt til mennesker i terrariet. Den sidder ofte helt stille på en gren eller stamme og bevæger sig sjældent hurtigt.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Cambodja og Vietnam.