herpy

AGAMER

Boulenger's Pricklenape

Acanthosaura crucigera

Acanthosaura crucigera er en brun til grågrøn skovagam med et mørkt, korsformet mærke i nakken, en torn bag hvert øje og en høj kam af pigge i nakken. Den lever i bjergskove fra Myanmar og Thailand til det nordlige Malaysia og Cambodia, bliver omkring 25 cm og bruger både stammer og skovbund. Den skal have et højt, fugtigt og køligt terrarie, hvor luften ikke bliver varmere end 28 °C.

Familie: Agamidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**25-26 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**100 × 50 × 120 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Hotspot	**28-30 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Vanddel**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**6-12 æg**
Inkubation	**110-130 dage** ved 25-27 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Pasningen af *Acanthosaura crucigera* er kun beskrevet i få kilder.
TEMPERATUR	*Acanthosaura crucigera* tåler varme dårligt. Luften i terrariet skal ligge på 22-26 °C om dagen og må ikke blive varmere end 28 °C. Bliver det varmere i længere tid, er der risiko for hedeslag, stress og udtørring.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal ligge på 70-90 % hele døgnet, med de højeste værdier om natten og om morgenen. Forstøv terrariet grundigt med blødt vand et par gange om dagen, så der hænger dråber på planter og vægge.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv, men lever i skyggen i skoven og har brug for forholdsvis svag UVB. Brug et T5 HO-rør på 6 % (Ferguson-zone 2) i et reflekterende armatur over nettet, der dækker omkring halvdelen af terrariets længde.
FODER	Arten tager næsten alt, den kan overmande: fårekyllinger, kakerlakker, græshopper, silkeorme, larver af soldaterfluer, regnorme og små nøgne snegle.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Acanthosaura crucigera* forlader sig på sin camouflage og sidder ofte helt stille på en stamme eller på bunden. Bliver den opdaget, bliver den mørkere, rejser sig på forbenene, spiler strubesækken ud og åbner gabet.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Cambodja, Malaysia, Myanmar (Burma) og Thailand.