herpy

AGAMER

Brown Pricklenape

Acanthosaura lepidogaster

Acanthosaura lepidogaster er en grågrøn til brun skovagam med en torn bag hvert øje og en lav kam af pigge i nakken. Den er udbredt fra det sydlige Kina over Vietnam og Laos til Thailand og Myanmar. Arten bliver 20-28 cm, lever i buskadset og på skovbunden og skal have et fugtigt, forholdsvis køligt terrarie, hvor luften ikke bliver varmere end 28 °C.

Familie: Agamidae Tidligere navn: *Acanthosaura lamnidentata; Acanthosaura fruhstorferi; Acanthosaura braueri* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**20-28 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**100 × 50 × 100 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**20-26 °C**
Hotspot	**28-30 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Vanddel**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**6-12 æg**
Inkubation	**110-130 dage** ved 25-27 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 100 × 50 × 100 cm (længde × bredde × højde). Arten bruger både grenene og bunden, så grundfladen er lige så vigtig som højden. Et par skal have mere plads.

TEMPERATUR

Acanthosaura lepidogaster tåler varme dårligt. Luften i terrariet skal ligge på 20-26 °C om dagen og må ikke blive varmere end 28 °C. Bliver det varmere i længere tid, er der risiko for hedeslag, stress og udtørring.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden skal ligge på 70-80 % om dagen og gerne omkring 90 % om natten. Sprøjt terrariet grundigt med blødt vand 2-3 gange om dagen, så der hænger dråber på planter og vægge. Et regnanlæg på timer holder niveauet stabilt.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv, men lever i skyggen i skoven og har kun brug for svag UVB. Brug et T5 HO-rør på 6 % (Ferguson-zone 2) i et reflekterende armatur over nettet, der dækker omkring halvdelen af terrariets længde.

FODER

Arten lever af insekter og andre smådyr. Giv en varieret kost af fårekyllinger, kakerlakker, græshopper, silkeorme, regnorme og små nøgne snegle.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Acanthosaura lepidogaster er en rolig skovagam, der ofte sidder helt stille på en gren, en stamme eller bunden. Den bevæger sig sjældent hurtigt.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Kina, Laos, Myanmar (Burma), Thailand og Vietnam.