herpy

AGAMER

Bibron's Agama

Agama bibronii

Agama bibronii er en mellemstor, dagaktiv klippeagam fra Marokko og de nærmeste dele af Algeriet og Vestsahara. Hannen får i yngletiden kobberorange hoved og blålilla krop. Arten kræver et rummeligt, tørt terrarie, en meget varm solplads, kraftig UVB og køligt om natten. Der findes kun lidt viden om pasningen.

Familie: Agamidae Tidligere navn: *Agama impalearis*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**25-30 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Klippeboende og jordboende**
Biotop	**Halvørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-32 °C**
Hotspot	**38-43 °C**
Temperatur, nat	**16-20 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter og planter**
Holdes	**Enkeltvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**12-24 mdr.**
Kuldstørrelse	**5-23 æg**
Kuld pr. år	**1-2**
Inkubation	**41-67 dage** ved 28-32 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes kun lidt viden om pasningen af *Agama bibronii*. Arten er sjælden i terrarier, men er opdrættet over flere generationer.

TEMPERATUR
A. bibronii skal have en tydelig gradient. Solpladsen skal have en overfladetemperatur på 38-43 °C, målt med et infrarødt termometer. I resten af terrariet er der 24-32 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal ligge på 30-50 %. *Agama bibronii* kommer fra tørre til halvtørre egne, så terrariet skal være tørt, med god ventilation. Forstøv væggene let en eller to morgener om ugen; dyret drikker gerne dråber.

LYS OG UVB
A. bibronii er dagaktiv og soler sig hele dagen, så den skal have kraftigt lys og UVB svarende til Ferguson-zone 3. Det er lånt fra *Agama agama*, men passer til artens åbne, solbeskinnede levesteder.

FODER
Agama bibronii er først og fremmest insektæder. Giv en varieret kost af godt fodrede insekter: kakerlakker, fårekyllinger, græshopper og i mindre mængder melorme og supermelorme.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
A. bibronii er hurtig, vagtsom og territorial. Hannerne forsvarer et område med truende positurer: de hæver kroppen, pumper med forbenene, spiler struben ud og slår om sig med halen. To hanner må aldrig holdes sammen.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Marokko, Vestsahara og Algeriet.