herpy

AGAMER

Mwanza Flat-headed Agama

Agama mwanzae

Agama mwanzae er en dagaktiv klippeagam fra savanne og halvørken i Østafrika. Den dominerende han har mørkeblå krop og rødt eller violet hoved, hals og skuldre. Arten er hurtig, klatrer godt og skal have et rummeligt, tørt terrarie med en meget varm solplads og kraftig UVB.

Familie: Agamidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**15-23 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Klippeboende og jordboende**
Biotop	**Halvørken, savanne og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**90 × 60 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**28-35 °C**
Hotspot	**40-45 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**20-40 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**5-7 æg**
Inkubation	**60-90 dage** ved 26-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Agama mwanzae holdes og formeres i fangenskab, men pasningen er kun sparsomt beskrevet. Tallene for avl er lånt fra den nært beslægtede *Agama agama*.

TEMPERATUR

Agama mwanzae skal have en tydelig gradient. Solpladsen skal have en overfladetemperatur på 40-45 °C, målt med et infrarødt termometer. Den varme ende af terrariet skal være 30-35 °C og den kølige ende omkring 28 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden skal ligge på 20-40 %. Stil altid en lav, stabil skål med frisk vand i terrariet, og skift vandet dagligt, for arten drikker meget. Forstøv væggene let en eller to gange om ugen, så dyret også kan drikke dråber.

LYS OG UVB

Agama mwanzae er dagaktiv og soler sig meget, så den skal have kraftigt lys og UVB svarende til Ferguson-zone 3. Brug et T5 HO-rør på 10-12 % i en reflekterende armatur over solpladsen og den varme halvdel af terrariet.

FODER

Agama mwanzae er insektæder. Giv en varieret kost af godt fodrede insekter: kakerlakker og fårekyllinger som hovedfoder og melorme og supermelorme i mindre mængder. Fede insekter som voksmøllarver er kun til godbidder.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Agama mwanzae er hurtig, vagtsom og territorial. To hanner må aldrig holdes sammen, for de kæmper og giver hinanden alvorlige skader.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Tanzania, Kenya og Rwanda.