herpy

AGAMER

Green Crested Lizard

Bronchocela cristatella

Bronchocela cristatella er en lysegrøn, meget slank trægående agam fra Sydøstasiens skove, hvor halen udgør over tre fjerdedele af længden. Den bliver 50-58 cm, er dagaktiv og jager insekter i træerne. Den kan skifte fra klar grøn til brun, når den bliver urolig, og den er hurtig, springstærk og sky.

Familie: Agamidae Tidligere navn: *Calotes cristatellus; Agama cristatella; Agama moluccana* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**50-58 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 150 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Hotspot	**32-38 °C**
Temperatur, nat	**22-25 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**2 æg**
Inkubation	**47-80 dage** ved 27-31 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Bronchocela cristatella*.
TEMPERATUR	Temperaturen følger klimaet i udbredelsesområdet. Dagtemperaturen i terrariet skal ligge på 25-30 °C, og på en solplads højt oppe på en gren skal der være 32-38 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Den relative luftfugtighed skal ligge på 70-90 %, som i en tropisk lavlandsskov. Sprøjt terrariet grundigt to gange dagligt, så blade og grene er våde. Dyret drikker dråber fra planterne, og en skål er ikke nødvendig.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og soler sig i skovbryn og lysninger, så den skal have kraftigt lys og UVB. Brug et T5 HO-rør på 6 % over solpladsen, svarende til Ferguson-zone 2 med et UV-indeks på 2-3 ved solpladsen og lavere i planterne.
FODER	*Bronchocela cristatella* lever af insekter, som den fanger i buske og træer, blandt andet tæger.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er sky og bliver let stresset. Under stress bliver den brun, og den kan flygte ind i løvet eller springe fra grenene. Den egner sig ikke til håndtering og er et dyr til at kigge på.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Malaysia, Singapore, Indonesien, Filippinerne, Thailand og Brunei.