herpy

AGAMER

Maned Forest Lizard

Bronchocela jubata

Bronchocela jubata er en slank, grøn trægående agam fra Sundaøernes skove med en kraftig, hårlignende nakkekam og en hale, der udgør omkring fire femtedele af længden. Den bliver 55-57 cm, er dagaktiv og lurer på insekter i buske og lavt løv. Den kan skifte fra grøn til brun eller sort, når den bliver truet, og den er sky og ikke et dyr til håndtering.

Familie: Agamidae Tidligere navn: *Calotes jubatus; Bronchocela petersidoriai*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**55-57 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 150 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Hotspot	**32-38 °C**
Temperatur, nat	**22-25 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**2 æg**
Inkubation	**47-80 dage** ved 27-31 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes kun lidt dokumenteret viden om pasningen af *Bronchocela jubata*. Pasningen bygger på klimaet og levestedet i naturen og på den nært beslægtede *Bronchocela cristatella*, som har samme krav.

TEMPERATUR
Temperaturerne er lånt fra klimaet i udbredelsesområdet og fra *Bronchocela cristatella*. Dagtemperaturen i terrariet skal ligge på 25-30 °C, og på en solplads højt oppe på en gren skal der være 32-38 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Den relative luftfugtighed skal ligge på 70-90 %, som i en tropisk lavlandsskov. Forstøv terrariet grundigt to gange dagligt, så blade og grene er våde. Dyret drikker dråber fra planterne, og en skål er ikke nødvendig.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og lever i lyse buske og skovbryn, så den skal have kraftigt lys og UVB. Brug et T5 HO-rør på 6 % over solpladsen, svarende til Ferguson-zone 2 med et UV-indeks på 2-3 ved solpladsen og lavere i planterne.

FODER
Bronchocela jubata lever af insekter som sommerfugle, møl, guldsmede, fluer og andre små insekter. Den fanger dem fra et stille udkigspunkt i en busk.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Arten er sky og bliver let stresset. Når den føler sig truet, skifter den til brun eller sort og flygter ind i løvet. Den egner sig ikke til håndtering og er et dyr til at kigge på.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Indonesien og Malaysia.