herpy

AGAMER

Forest Garden Lizard

Calotes emma

Calotes emma er en slank, dagaktiv agam fra skovene i Sydøstasien, der klatrer i buske og lave træer og kendes på de små grupper af torne bag øjet og over trommehinden. Den bliver 28-35 cm, er brun med mørke bånd og lever af insekter. Der findes næsten ingen viden om pasning i fangenskab, så vejledningen bygger på levestedet og på den nære slægtning *Calotes versicolor*.

Familie: Agamidae Tidligere navn: *Calotes alticristatus*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**28-35 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**8-12 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Tørskov og regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**100 × 50 × 100 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-29 °C**
Hotspot	**33-38 °C**
Temperatur, nat	**21-24 °C**
Luftfugtighed	**65-85 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**10-12 æg**
Inkubation	**60-70 dage** ved 27-31 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes næsten ingen viden om pasningen af *Calotes emma*, og arten er sjælden i fangenskab. Pasningen her bygger på levestedet (tropisk skov, lave grene og krat, 30-150 cm over jorden) og på størrelsen.
TEMPERATUR	Arten har brug for en tydelig gradient. Dagtemperaturen i terrariet skal ligge på 25-29 °C, og på solpladsen skal der være 33-38 °C, målt på overfladen med et IR-termometer. Om natten skal der være 21-24 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Den relative luftfugtighed skal ligge på 65-85 %. Det opnås ved at forstøve terrariet let en til to gange dagligt og lade bunden og planterne tørre delvist mellem forstøvningerne.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og soler sig, så den har brug for kraftigt lys og UVB. Brug et UVB-rør på 5-7 % (T5 HO) over solpladsen, svarende til Ferguson-zone 2.
FODER	*C. emma* er insektæder. I naturen æder den græshopper, myrer, termitter, kakerlakker, biller, natsommerfugle og larver. Planteføde er ikke dokumenteret.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er dagaktiv og hurtig og kan smutte ud, når låget åbnes. Giv et nyt dyr et par uger i fred. Den egner sig til at kigge på og ikke til hyppig håndtering, og skal den tages op, så støt kroppen og grib aldrig i halen.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Kina, Indien, Bangladesh, Myanmar (Burma), Thailand, Laos, Vietnam, Cambodja og Malaysia.