herpy

AGAMER

Kraveagam

Chlamydosaurus kingii

Chlamydosaurus kingii er en stor, trælevende agam fra det nordlige Australien og det sydlige New Guinea. Den er kendt for den store hudkrave om halsen, som den spærrer ud i et truende forsvar. Den bliver 60-90 cm, er dagaktiv og lever af insekter. Til gengæld kræver den et meget højt terrarie, kraftig varme og UVB, og den er sky og let at stresse.

Familie: Agamidae Engelsk: Frilled Lizard Tidligere navn: *Clamydosaurus kingii* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**60-90 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**400-870 g**
Levetid	**8-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Savanne og tørskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**150 × 75 × 150 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Hotspot	**38-42 °C**
Temperatur, nat	**23-27 °C**
Luftfugtighed	**60-70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**24-36 mdr.**
Kuldstørrelse	**4-20 æg**
Kuld pr. år	**2-4**
Inkubation	**70-110 dage** ved 28-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter. Spørg sælger om dyrets herkomst.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 150 × 75 × 150 cm (længde × bredde × højde). Højden er vigtigere end gulvarealet, for arten er trælevende, og hvor højt dyret kan sidde, giver tryghed.

TEMPERATUR
Solpladsen skal ligge øverst i terrariet og have en overfladetemperatur på 38-42 °C, med omkring 40 °C som udgangspunkt.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal ligge på 60-70 %, og terrariet skal sprøjtes. Arten lever i et klima med kraftig regn om sommeren og drikker vanddråber. Et regnanlæg, der kører et par gange om dagen, passer bedst.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og soler sig, så den har brug for et kraftigt lys over hele terrariet og en solplads med varme- og UVB-lys. Sæt en lysstofrørs- eller LED-lampe på 6.500 K i terrariets længde ud over varmelamperne.

FODER
Chlamydosaurus kingii er insektæder. Foderet består af fårekyllinger, kakerlakker, sommerfuglelarver, silkeorme og enkelte supermelorme. Termitter og myrer er de vigtigste byttedyr i naturen.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
C. kingii er rolig og stillesiddende i terrariet, men sky over for bevægelser i rummet. Nogle dyr tåler at blive taget ud, men håndtering stresser dem let, og dyret kan hvæse, spærre kraven ud og bide.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Australien, Papua Ny Guinea og Indonesien.