herpy

AGAMER

## Mallee Dragon

# *Ctenophorus fordi*

*Ctenophorus fordi* er en lille, dagaktiv agam fra Australiens tørre, sandede krat, hvor den især lever af myrer. Den bliver 13-18 cm lang, og halen udgør godt to tredjedele. Oversiden er sandfarvet til rødlig orangebrun med en lys stribe langs hver side. Der findes meget lidt pasningsviden for netop arten, så kravene bygger på klimaet og på den beslægtede *Ctenophorus nuchalis*.

Familie: Agamidae  Tidligere navn: *Amphibolurus fordi; Phthanodon fordi*

## SPECIFIKATIONER

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **13-18 cm**<br>total længde inkl. hale |
| Levetid | **1-2 år** |
| Aktiv | **Dag** |
| Levevis | **Jordboende og gravende** |
| Biotop | **Ørken og halvørken** |
| Sværhedsgrad | **Erfaren** |

### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **100 × 40 × 40 cm**<br>L × B × H til 3 voksne dyr |
| Temperatur, dag | **25-30 °C** |
| Hotspot | **35-40 °C** |
| Temperatur, nat | **20-25 °C** |
| Luftfugtighed | **20-40 %** |
| Vand | **Vandskål** |
| UVB | **Nødvendig**<br>Ferguson-zone 3 |
| Kost | **Insekter og planter** |
| Holdes | **Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Kuldstørrelse | **2-5 æg** |
| Inkubation | **56-77 dage**<br>ved 28-32 °C |

### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Appendiks III** |
| EU-bilag | **Bilag C** |
| IUCN | **Ikke truet (LC)** |

Arten er opført på CITES liste III (af Australien) og i EU's bilag C (forordning 338/97). Dokumentation kræves i praksis kun ved indførsel til EU fra eksportlandet. CITES-myndighed i Danmark er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

## Pasning i korte træk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Der findes meget lidt viden om pasningen af *Ctenophorus fordi*. Klimaet i udbredelsesområdet er tørt med varme somre og kølige vintre. |
| **TEMPERATUR** | Luften i terrariet er 25-30 °C om dagen, og den kølige ende er omkring 25 °C. Under solpladsen skal overfladen være 35-40 °C og ikke over 43 °C. |
| **LUFTFUGTIGHED OG VAND** | Luftfugtigheden skal være lav, omkring 20-40 %; tallet er et skøn ud fra levestedet. Terrariet er tørt og godt ventileret. Stil friskt drikkevand i en lav, tung skål, der skiftes hver dag, og forstøv ikke sandet. |
| **LYS OG UVB** | Arten er dagaktiv og skal have stærkt lys og UVB. Ferguson-zone 3 er et godt udgangspunkt; zonen er lånt fra andre dagaktive ørkenagamer. Brug et kraftigt UVB-rør eller en kviklampe over solpladsen, så dyret kan komme tæt på. |
| **FODER** | Arten æder næsten kun små leddyr, især myrer. I terrariet er små fårekyllinger, små kakerlakker og andre små insekter hovedfoderet. |
| **ADFÆRD OG HÅNDTERING** | Arten er hurtig og sky og søger straks skjul i en tue eller ned i sandet, hvis den forskrækkes. Håndtering er ikke nødvendig og stresser dyret. Hanner og hunner signalerer begge med hovednik, når de møder et andet dyr. |
| **OPRINDELIG UDBREDELSE** | Australien. |