herpy

AGAMER

Painted Dragon

Ctenophorus pictus

Ctenophorus pictus er en lille, dagaktiv agam fra Australiens tørre indre, hvor hannen om foråret lyser i rødt, gult og blåt. Den bliver 18-25 cm, graver sig ned i sand og lever af insekter. Arten er en travl og hurtig terrarieøgle, der kræver et langt, sandet terrarie, stærk varme og UVB, men ikke meget højde. Arten er meget kortlivet, og der findes kun lidt pasningsviden for netop den.

Familie: Agamidae Tidligere navn: *Amphibolurus pictus; Ctenophorus dudleyi* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**18-25 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**8-16 g**
Levetid	**1-2 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Ørken og halvørken**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**100 × 40 × 40 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Hotspot	**35-40 °C**
Temperatur, nat	**20-25 °C**
Luftfugtighed	**20-40 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter og planter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**2-4 æg**
Kuld pr. år	**1-4**
Inkubation	**55-80 dage** ved 28-32 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er opført på CITES liste III (af Australien) og i EU's bilag C (forordning 338/97). Dokumentation kræves i praksis kun ved indførsel til EU fra eksportlandet. CITES-myndighed i Danmark er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et par eller en lille gruppe på op til tre voksne dyr skal have et terrarie på mindst 100 × 40 × 40 cm (længde × bredde × højde). Målet er lånt fra *Ctenophorus nuchalis*, der har samme levevis.
TEMPERATUR	Arten er en ørkenøgle og skal have en stor temperaturforskel.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være lav, omkring 20-40 %; tallet er et skøn ud fra levestedet. Terrariet skal ventileres godt og holdes tørt, og sandet må ikke blive fugtigt, med undtagelse af æglægningshjørnet.
LYS OG UVB	Dagaktive ørkenarter har brug for stærkt lys og UVB. Ferguson-zonen er ikke fastlagt for arten; *C. nuchalis* hører til zone 3-4, og zone 3 er et godt udgangspunkt.
FODER	Arten æder mest insekter, ofte myrer og andre små leddyr i naturen, og enkelte dyr tager også plantedele. I terrariet er fårekyllinger og kakerlakker hovedfoderet, med melorme og silkeorme som afveksling.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Dyret er hurtigt, nervøst og trækker sig hurtigt væk, hvis det forskrækkes. Håndtering er ikke nødvendig og stresser dyret. Hannen markerer sit område med hovednik og armsving.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.