herpy

AGAMER

## Weber's Sailfin Lizard

# *Hydrosaurus weberi*

*Hydrosaurus weberi* er en stor, semi-akvatisk agam fra Halmahera og naboøerne i Indonesien. Hannen har en kam i nakken og et højt sejl på halen, og dyret bliver 60-100 cm. Det soler sig i grene over vandet og kaster sig ned i det ved fare. Arten er sårbar i naturen og kræver et meget stort, varmt og fugtigt terrarie med en dyb vanddel og kraftig UVB.

Familie: Agamidae  Tidligere navn: *Lophura weberi*

### SPECIFIKATIONER

#### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **60-100 cm**<br>total længde inkl. hale |
| Vægt | **1.400-2.300 g** |
| Levetid | **15-25 år** |
| Aktiv | **Dag** |
| Levevis | **Træboende og semi-akvatisk** |
| Biotop | **Regnskov og vådområde** |
| Sværhedsgrad | **Ekspert** |

#### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **200 × 80 × 150 cm**<br>L × B × H til 1 voksent dyr |
| Temperatur, dag | **26-32 °C** |
| Hotspot | **35-45 °C** |
| Temperatur, nat | **24-27 °C** |
| Luftfugtighed | **75-90 %** |
| Vand | **Akvaterrarie**<br>dybde 30-50 cm |
| UVB | **Nødvendig**<br>Ferguson-zone 3 |
| Kost | **Insekter, frugt, planter og hvirveldyr** |
| Holdes | **Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner** |

#### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Kuldstørrelse | **2-8 æg** |
| Inkubation | **60-70 dage**<br>ved 28-30 °C |

#### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ikke omfattet** |
| EU-bilag | **Ikke omfattet** |
| IUCN | **Sårbar (VU)** |

Arten står hverken på CITES-listerne eller i EU's bilag A-D. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter. IUCN vurderer arten som sårbar (VU). Spørg Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø ved tvivl om dokumentation.

## Pasning i korte træk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Der findes kun lidt pasningsviden for netop *Hydrosaurus weberi*. Tallene i dette afsnit og de følgende er lånt fra slægtens bedre kendte arter, især *Hydrosaurus pustulatus*, som lever på samme måde og bliver større. |
| **TEMPERATUR** | Luften holdes på 26-32 °C om dagen. Solpladsen over en yndlingsgren eller en høj hylde skal have en overfladetemperatur på 35-45 °C, målt med et infrarødt termometer. |
| **LUFTFUGTIGHED OG VAND** | Luftfugtigheden skal ligge på 75-90 %. Høj fugt er afgørende for, at hudskiftet går rent, også på kam, sejl og tæer. Forstøv terrariet mindst én gang om dagen, eller brug et tåge- eller regnanlæg, og hold bunden jævnt fugtig. |
| **VAND OG VANDKVALITET** | *Hydrosaurus weberi* bruger vandet til at svømme, flygte, køle sig af og drikke. Vanddelen skal være så stor, at dyret kan dykke og svømme frit, og mindst 30 cm dyb; op mod to tredjedele af bunden kan være vand. |
| **LYS OG UVB** | Arten er dagaktiv og soler sig, så den skal have kraftigt lys og UVB. Brug et kraftigt UVB-rør (T5 HO, 10-12 %) i en reflekterende armatur, der dækker en stor del af solpladsens område. |
| **FODER** | *Hydrosaurus weberi* er altædende, og kosten i terrariet består af planter og en moderat mængde animalsk føde. |
| **ADFÆRD OG HÅNDTERING** | Arten er nervøs og sky. Ved fare løber den, ofte på bagbenene, ned i vandet og bliver på bunden, til faren er drevet over. I terrariet kaster en forskrækket øgle sig mod glasset og slider snuden. |
| **OPRINDELIG UDBREDELSE** | Indonesien. |