herpy

AGAMER

Hardun

Laudakia stellio

Laudakia stellio er en kraftig, tornet klippeagam fra det østlige Middelhavsområde, grå til brun med lyse, stjerneformede pletter og en hale i tydelige ringe. Den er dagaktiv, klatrer godt, æder både insekter og planter og bliver 30-35 cm. Den skal have et tørt terrarie med en meget varm solplads, UVB og masser af sten at gemme sig i.

Familie: Agamidae Engelsk: Roughtail Rock Agama Tidligere navn: *Stellagama stellio; Agama stellio; Stellio stellio*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**30-35 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende, klippeboende og jordboende**
Biotop	**Halvørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**100 × 50 × 50 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**21-30 °C**
Hotspot	**40-46 °C**
Temperatur, nat	**17-20 °C**
Luftfugtighed	**15-35 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter og planter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**4-10 æg**
Inkubation	**60-90 dage** ved 26-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Arten står på bilag IV i EU's habitatdirektiv (som *Stellio stellio*). Efter artsfredningsbekendtgørelsen (BEK nr. 521/2021, § 11) må dyr indsamlet i naturen derfor ikke holdes, handles, overdrages eller udstilles i Danmark. Opdrættet afkom af lovligt erhvervede dyr er undtaget (§ 2), men ejeren skal kunne godtgøre, at dyret ikke stammer fra naturen (§ 20). Ingen agamer står på forbudslisten i BEK nr. 1261 af 17.11.2015, og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 100 × 50 × 50 cm (længde × bredde × højde). Et par eller en han med et par hunner skal have mindst 120 × 60 × 60 cm.

TEMPERATUR
Laudakia stellio skal have en tydelig gradient. Solstenen skal have en overfladetemperatur på 40-46 °C, målt med et infrarødt termometer, mens den kølige ende ligger på 21-29 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden om dagen skal ligge på 15-35 %. Forstøv væggene let om morgenen, så dyret kan drikke dråber, for agamer drikker gerne dråber frem for af en skål.

LYS OG UVB
Laudakia stellio er dagaktiv og soler sig meget, så den skal have kraftigt lys og UVB svarende til Ferguson-zone 3. Brug et T5 HO-rør på 10-12 % i en reflekterende armatur i samme side som varmelampen.

FODER
Laudakia stellio er altædende, men insekter udgør den største del af kosten.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Laudakia stellio er sky og hurtig, men tåler som regel rolig håndtering. Tag aldrig dyret oppefra; løft det nedefra, og støt krop og ben. Lad helst dyret selv kravle op på hånden, og tag det aldrig ud af et gemmested.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Grækenland og Tyrkiet.