herpy

AGAMER

Common Butterfly Lizard

Leiolepis belliana

Leiolepis belliana er en jordlevende, dagaktiv agam fra Sydøstasien, der graver dybe huler i sandet jord. Den har gule pletter på ryggen og orange og sorte tværbånd på siderne, og den kan brede sideskindet ud som en sommerfugl. Arten bliver 40-50 cm, mest hale, lever mest af insekter og kræver et tørt terrarie med dyb, gravbar bund, kraftig varme og UVB.

Familie: Agamidae Tidligere navn: *Leiolepis bellii; Uromastyx belliana* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**40-50 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**8-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Savanne**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 50 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**26-35 °C**
Hotspot	**35-37 °C**
Temperatur, nat	**20-25 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter og planter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**3-8 æg**
Inkubation	**55-75 dage** ved 28-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter. Spørg sælger om dyrets herkomst.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et par skal have et terrarie på mindst 120 × 60 × 50 cm (længde × bredde × højde). Gulvarealet er vigtigst, for arten er jordlevende, men højden skal rumme en dyb bund.

TEMPERATUR
Solpladsen skal have en overfladetemperatur på 35-37 °C. Følg dyrets adfærd, og justér derefter. Luften i den varme ende er 30-35 °C, og den kølige ende er 26-29 °C. Om natten falder temperaturen til 20-25 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal ligge på 30-50 %, og terrariet skal være tørt. Sprøjtning er normalt ikke nødvendig, undtagen i meget tørre omgivelser. Dyret skal have en skål med friskt vand, stor nok til at bade i.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og soler sig i åbent land, så den har brug for kraftigt lys og UVB. Brug et rør eller en LED på 6.500 K over hele terrariet og et T5 HO UVB-rør på 10-12 % over solpladsen.

FODER
Leiolepis belliana æder mest insekter, men også planter. I naturen tages græshopper, billelarver, sommerfugle og krabber, og dyrene æder også græs og andre planter.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Dyret er sky og hurtigt og flygter ned i en hule, når noget bevæger sig. Det tåler dårligt håndtering. I naturen er dyrene monogame og deler hule med en partner. Dyrene kan holdes enkeltvis eller parvis.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Thailand, Myanmar (Burma), Cambodja, Vietnam, Malaysia og Indonesien.