herpy

AGAMER

Spotted Butterfly Lizard

Leiolepis guttata

Leiolepis guttata er en jordlevende, dagaktiv agam fra kystegnene i det centrale og sydlige Vietnam. Den er en af slægtens største arter med en samlet længde på op til omkring 55 cm, har mange lyse pletter på ryggen og graver huler. Arten er dårligt kendt i fangenskab og kræver et rummeligt, tørt terrarie med dyb, gravbar bund, kraftig varme og UVB.

Familie: Agamidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**40-55 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**8-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Savanne**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**150 × 60 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**26-35 °C**
Hotspot	**35-37 °C**
Temperatur, nat	**20-25 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter og planter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**2-8 æg**
Inkubation	**55-100 dage** ved 27-33 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Utilstrækkelige data (DD)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter. Spørg sælger om dyrets herkomst.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Der findes kun lidt viden om pasningen af *Leiolepis guttata*. Temperatur, fugt, lys og levetid bygger derfor på *Leiolepis belliana*, den bedst kendte art i slægten. *L. guttata* bliver større, så terrariet skal også være større.

TEMPERATUR

Solpladsen skal have en overfladetemperatur på 35-37 °C. Luften i den varme ende er 30-35 °C, og den kølige ende er 26-29 °C. Om natten falder temperaturen til 20-25 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden skal ligge på 30-50 %, og terrariet skal være tørt. Det nederste lag af bunden holdes svagt fugtigt, så hulerne ikke falder sammen, men overfladen må ikke være våd, for det giver skimmel.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og soler sig i åbent land, så den har brug for kraftigt lys og UVB. Brug et rør eller en LED på 6.500 K over hele terrariet og et T5 HO UVB-rør på 10-12 % over solpladsen.

FODER

Leiolepis guttata lever overvejende af planter, men æder også insekter. Grundstammen er mørkegrønne blade som mælkebøtte, kålblade og sennepsgrønt samt blomster, som tilbydes hver dag.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Dyret er sky og hurtigt og flygter ned i en hule, når noget bevæger sig. Det tåler dårligt håndtering og passer bedst til en holder, der vil iagttage et dyr, der graver og soler sig. Dyrene kan holdes enkeltvis eller parvis.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Vietnam.