herpy

AGAMER

Eyed Butterfly Agama

Leiolepis ocellata

Leiolepis ocellata er en jordlevende, dagaktiv agam fra det nordlige Thailand, der graver huler i tør løvfældende skov, græsland og marker. Den adskiller sig fra *Leiolepis belliana* ved store, øjelignende pletter på ryggen, og hunnerne har rød hage. Arten kræver et terrarie med dyb, gravbar bund, kraftig varme og UVB, og i naturen ligger den i hulen i den kølige tid.

Familie: Agamidae Tidligere navn: *Leiolepis belliana ocellata* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**35-50 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**45-100 g**
Levetid	**8-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Savanne og tørskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 50 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**26-35 °C**
Hotspot	**35-37 °C**
Temperatur, nat	**20-25 °C**
Luftfugtighed	**40-70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter og planter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**3-8 æg**
Inkubation	**55-100 dage** ved 27-33 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter. Spørg sælger om dyrets herkomst.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Der findes kun lidt viden om pasningen af *Leiolepis ocellata*. Terrarie, temperatur, lys og levetid bygger derfor på den nære slægtning *Leiolepis belliana*, mens luftfugtighed og årsrytme bygger på klimaet i udbredelsesområdet.

TEMPERATUR

Solpladsen skal have en overfladetemperatur på 35-37 °C. Luften i den varme ende er 30-35 °C, og den kølige ende er 26-29 °C. Om natten falder temperaturen til 20-25 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

I udbredelsesområdet svinger luftfugtigheden fra omkring 50 % i den tørre tid til over 80 % i regntiden. I terrariet passer 40-70 %.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og soler sig i åbent land, så den har brug for kraftigt lys og UVB. Brug et rør eller en LED på 6.500 K over hele terrariet og et T5 HO UVB-rør på 10-12 % over solpladsen.

FODER

Leiolepis ocellata er altædende og æder insekter og unge planteskud. Giv fårekyllinger, kakerlakker, græshopper og melorme, og tilbyd mørkegrønne blade som mælkebøtte, kålblade og sennepsgrønt samt blomster.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Dyret er sky og hurtigt og flygter ned i en hule, når noget bevæger sig. Det tåler dårligt håndtering. Dyrene kan holdes enkeltvis eller parvis. To hanner må ikke sættes sammen, for de kæmper.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Thailand og Myanmar (Burma).