herpy

AGAMER

Reeves' Butterfly Lizard

Leiolepis reevesii

Leiolepis reevesii er en jordlevende, dagaktiv agam fra Sydkina og Sydøstasien, der graver huler i sandet jord og kan brede sideskindet ud som en sommerfugl. Ryggen har tætsiddende lyse pletter, hvis mørke kanter danner et grovmasket net. Arten bliver op til omkring 50 cm, mest hale, går i hi om vinteren og kræver et tørt terrarie med dyb, gravbar bund, kraftig varme og UVB.

Familie: Agamidae Tidligere navn: *Uromastyx reveesii* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**30-50 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**8-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Savanne**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 50 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**26-35 °C**
Hotspot	**35-37 °C**
Temperatur, nat	**20-25 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter og planter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**2-8 æg**
Inkubation	**55-100 dage** ved 27-33 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter. Spørg sælger om dyrets herkomst.

Om arten

Leiolepis reevesii er en fladtrykt, slank agam med afrundet hoved, lang hale og små, kornede rygskæl. Ryggen har mange tætsiddende lyse pletter, hvis mørke kanter danner et grovmasket net. På siderne sidder orange- til murstensrøde og sorte tværbånd, der er mindre markante end hos *Leiolepis belliana*. Der er 13-16 lårporer på hver side.

Kropslængden fra snude til kloak er op til 15-17 cm, og enkelte angivelser går op til 19 cm. Halen bliver op til 34 cm, så store dyr måler omkring 50 cm i alt. Hannerne er større end hunnerne og har et større hoved. Nyklækkede unger måler knap 4 cm fra snude til kloak.

Arten blev beskrevet i 1831 som *Uromastyx reveesii* og er opkaldt efter John Reeves, en engelsk naturforsker, der boede i Kina fra 1812 til 1831. Slægten *Leiolepis* er taksonomisk kompliceret. Grænsen mod *L. belliana* er ikke helt skarp, og arten kan krydses med både *L. belliana* og *Leiolepis guttata*. Den rødbåndede form *rubritaeniata* blev tidligere regnet som underart af *L.*

reevesii og føres nu som selvstændig art, *Leiolepis rubritaeniata*. *L. reevesii* formerer sig kønnet, men gentagne krydsninger mellem den og *L. guttata* har givet ophav til slægtens fire rene hunarter. Ved køb er det værd at sikre sig, at dyret er bestemt rigtigt.

Udbredelse og levested

Leiolepis reevesii lever i Sydkina (Guangdong, Guangxi, Hainan og Macao), Vietnam, Cambodja og Thailand. Typelokaliteten er kun angivet som Kina. Afgrænsningen mod *Leiolepis belliana* og *Leiolepis rubritaeniata* gør den præcise udbredelse i Sydøstasien usikker.

> **Oprindelig udbredelse:** Kina, Vietnam, Cambodja og Thailand.

LEVESTED

Arten lever i åbne, varme områder med sandet jord og spredt vegetation, hvor den graver huler, som den bruger til skjul, overnatning og æglægning. Dyrene soler sig tæt ved hulens indgang og flygter ned i den ved ringe forstyrrelse.

Hainan har kun to årstider, en regntid og en tørtid. Alligevel går dyrene i hi fra slutningen af november til begyndelsen af marts, og i den tid ligger de i hulerne og æder ikke. Om sommeren er tarmfloraen præget af bakterier, der nedbryder plantefibre, mens den om vinteren er tilpasset den lange faste.

Pasning

TERRARIET

Der findes kun lidt viden om pasningen af *Leiolepis reevesii*. Terrarie, temperatur, fugt, lys og levetid bygger derfor på *Leiolepis belliana*, den bedst kendte art i slægten, som lever under lignende forhold.

Et par skal have et terrarie på mindst 120 × 60 × 50 cm (længde × bredde × højde). Gulvarealet er vigtigst, for arten er jordlevende, men højden skal rumme en dyb bund. Et enkelt dyr kan klare sig med 90 × 45 × 45 cm.

Bunden skal være mindst 20 cm dyb og bestå af en blanding af sand og gødningsfri havejord, så hulerne holder. Det nederste lag er svagt fugtigt, resten tørt. Læg flade sten, kork og rødder, så dyret har solpladser og skjul, og sæt dem fast, så de ikke kan undergraves og vælte. Ventilationen skal være god, og låget skal kunne låses, for dyrene er hurtige og sky.

TEMPERATUR

Solpladsen skal have en overfladetemperatur på 35-37 °C. Luften i den varme ende er 30-35 °C, og den kølige ende er 26-29 °C. Om natten falder temperaturen til 20-25 °C.

Dyret skal altid kunne søge væk fra varmen, ned i bunden eller ind i et skjul. Brug halogenspots eller keramiske varmelegemer med gitter foran og en termostat. Mål med digitale termometre og et infrarødt termometer, og kontrollér solpladsen jævnligt. Et dyr, der konstant søger skjul fra varmen, har det for varmt, og et dyr, der ikke soler sig, har det for koldt.

I naturen går arten i hi om vinteren. Om en kølig hvileperiode er nødvendig eller gavnlig i terrariet, er ikke dokumenteret. Et dyr, der om vinteren trækker sig ind i hulen og holder op med at æde, skal ikke tvinges til at æde, men vejes jævnligt.

Læs mere: Varme og temperatur

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden skal ligge på 30-50 %, og terrariet skal være tørt. Det nederste lag af bunden holdes svagt fugtigt, så hulerne ikke falder sammen, men overfladen må ikke være våd, for det giver skimmel. Dyret skal have en skål med friskt vand, som fyldes dagligt.

Læs mere: Luftfugtighed, sprøjtning og ventilation

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og soler sig i åbent land, så den har brug for kraftigt lys og UVB. Brug et rør eller en LED på 6.500 K over hele terrariet og et T5 HO UVB-rør på 10-12 % over solpladsen. Ferguson-zonen er ikke fastlagt for slægten; zone 3 passer til en øgle, der soler sig i åbent land. Kontrollér afstanden med en UV-måler, og skift rørene efter producentens anvisning. Lyset skal være tændt 10-12 timer om dagen.

Læs mere: Lys og UVB

FODER

Leiolepis reevesii er altædende og æder både insekter og planter, og planteføden er en vigtig del af kosten. Giv fårekyllinger, kakerlakker, græshopper og melorme, og tilbyd hver dag mørkegrønne blade som mælkebøtte, kålblade og sennepsgrønt samt blomster. Frugt gives kun lidt. Salat har næsten ingen næring og undgås.

Unger og voksne fodres hver dag med det, dyret æder på omkring 10 minutter. Drys insekterne med kalk ved hvert foder og med en multivitamin med D3 en gang om ugen. Varier foderet.

Læs mere: Foderdyr: hold og avl Læs mere: Kalk, vitaminer og tilskud

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Dyret er sky og hurtigt og flygter ned i en hule, når noget bevæger sig. Det tåler dårligt håndtering og passer bedst til en holder, der vil iagttage et dyr, der graver og soler sig.

Dyrene kan holdes enkeltvis eller parvis. To hanner må ikke sættes sammen, for de kæmper. Giv rigeligt med solpladser og skjul, og sæt nye dyr i karantæne.

Læs mere: Karantæne og hygiejne

Avl

KØNSMODENHED OG KØNSBESTEMMELSE

Hannerne er større end hunnerne og har et større hoved, både absolut og i forhold til kroppen. Begge køn har lårporer. Hunnerne er kønsmodne fra en kropslængde på omkring 9 cm fra snude til kloak; alderen ved kønsmodenhed er ikke dokumenteret. En hun skal være fuldt udvokset og i god foderstand før parring, for æglægning dræner hende for kalk og kræfter.

PARRING

Arten formerer sig kønnet. I naturen kommer dyrene frem af vinterhiet i begyndelsen af marts, og æggene lægges fra april til juli. Hvordan parringen foregår i terrariet, og om en kølig hvileperiode fremmer avlen, er ikke dokumenteret. Hold parret sammen, så længe det går fredeligt.

ÆGLÆGNING OG KULD

Hunnen lægger 2-8 æg pr. kuld, i gennemsnit 3-4, i en hule. I naturen lægger hun ét kuld om året mellem april og juli; i fangenskab kan hun lægge flere kuld i samme sæson. Antallet af æg afhænger ikke af hunnens størrelse, og små hunner lægger relativt tungere kuld end store. Giv hunnen mulighed for at grave en hule i dyb, svagt fugtig bund i terrariets varme ende. En hun uden egnet sted kan tilbageholde æggene, og det er livsfarligt.

INKUBATION

Æggene klækker efter omkring 70 dage ved 30 °C, efter 55 dage ved 33 °C og først efter omkring 100 dage ved 27 °C. Flest æg klækker ved 30 °C, og unger fra 27 °C løber dårligere end unger fra varmere æg. I naturlige reder ligger temperaturen mest på 28-32 °C, så 30 °C er det bedste valg. Temperaturen bestemmer ikke kønnet. Grav æggene forsigtigt op uden at vende dem, og læg dem i fugtet vermiculit i en lukket boks i en rugemaskine med termostat.

OPDRÆT AF UNGER

Ungerne måler knap 4 cm fra snude til kloak, når de klækker. De skal have et eget terrarie med dyb bund og mange skjul. Fodr dem dagligt med små insekter og fint snittet grønt, drys med kalk, og giv UVB. Unger vokser hurtigt, og for lidt kalk og UVB giver knogleskørhed.

Sundhed og typiske fejl

De fleste problemer skyldes fejl i opsætningen. Hold især øje med:

- Knogleskørhed (metabolisk knoglesygdom), når der mangler UVB eller kalk. Bløde kæber, rystende ben og skæve lemmer er tegn; giv kraftig UVB og kalk på insekterne.
- Vægttab i vinterhvilen. Det er normalt, at dyret faster om vinteren, men vej det hver anden uge, og afbryd hvilen, hvis det taber sig mærkbart.
- Æglægningsbesvær hos hunner uden dyb, fugtig gravebund. En hun med synlige æg, der ikke lægger dem, skal til dyrlæge.

- Parasitter og mave-tarm-problemer hos nyindkøbte dyr. Få en afføringsprøve undersøgt i karantænen.
- Tarmstop, hvis dyret sluger store mængder løst sand. En bund med jord, der holder hulerne, mindsker risikoen.
- Skimmel og hudproblemer ved for våd bund.

Kontakt en dyrlæge, hvis dyret er sløvt, holder op med at æde uden for vinterhvilen eller har svært ved at skifte ham.

Læs mere: Typiske sygdomme og tegn på sygdom Læs mere: Vinterhvile og årstider

Spørg altid dine kloge bekendte

Vejledningen er et godt sted at begynde, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskellige, og meget af det vigtigste lærer man af dem, der har holdt arten i årevis. Tal med en avler, en erfaren holder eller en dyrlæge med forstand på krybdyr og padder, før du anskaffer dyret - og igen, hvis noget ser forkert ud.