herpy

AGAMER

Reeves' Butterfly Lizard

Leiolepis rubritaeniata

Leiolepis rubritaeniata er en jordlevende, dagaktiv agam fra Thailand, Laos, Cambodja og Vietnam, der graver huler i sandet jord og kan brede sideskindet ud som en sommerfugl. Den passes som den nært beslægtede *Leiolepis belliana*: et tørt terrarie med dyb, gravbar bund, kraftig varme og UVB. Der findes kun lidt viden om netop denne art, så de fleste tal er lånt.

Familie: Agamidae Tidligere navn: *Leiolepis belliana rubritaeniata; Leiolepis reevesii rubritaeniata* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**30-40 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**8-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Savanne**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 50 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**26-35 °C**
Hotspot	**35-37 °C**
Temperatur, nat	**20-25 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter og planter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**3-8 æg**
Inkubation	**55-75 dage** ved 28-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter. Spørg sælger om dyrets herkomst.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes kun lidt viden om pasningen af *Leiolepis rubritaeniata*. Tallene i vejledningen er lånt fra *Leiolepis belliana*, der har samme levevis og lever i samme slags landskab.

TEMPERATUR
Solpladsen skal have en overfladetemperatur på 35-37 °C. Luften i den varme ende er 30-35 °C, og den kølige ende er 26-29 °C. Om natten falder temperaturen til 20-25 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal ligge på 30-50 %, og terrariet skal være tørt. Sprøjtning er normalt ikke nødvendig. Dyret skal have en skål med friskt vand, stor nok til at bade i, og skålen fyldes dagligt.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og soler sig i åbent land, så den har brug for kraftigt lys og UVB. Brug et rør eller en LED på 6.500 K over hele terrariet og et T5 HO UVB-rør på 10-12 % over solpladsen.

FODER
Slægten *Leiolepis* er altædende, og *L. rubritaeniata* æder både insekter og planter; fordelingen er ikke kendt for arten.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Dyret er sky og hurtigt og flygter ned i en hule, når noget bevæger sig. Det tåler dårligt håndtering. Hos slægten deler en han og en hun ofte hule. Dyrene kan holdes enkeltvis eller parvis.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Thailand, Laos, Cambodja og Vietnam.