herpy

AGAMER

Thai Butterfly Lizard

Leiolepis triploida

Leiolepis triploida er en jordlevende, dagaktiv agam fra Den Malajiske Halvø, hvor alle dyr er hunner. Arten har tre kromosomsæt og formerer sig ved jomfrufødsel: æggene udvikles uden han, og ungerne er genetiske kopier af moderen. Den er stor og meget langhalet, graver huler og kræver et tørt terrarie med dyb bund, kraftig varme og UVB.

Familie: Agamidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**30-45 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**8-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Savanne**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 50 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**26-35 °C**
Hotspot	**35-37 °C**
Temperatur, nat	**20-25 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter og planter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-3 æg**
Inkubation	**55-100 dage** ved 27-33 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Utilstrækkelige data (DD)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter. Spørg sælger om dyrets herkomst.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Der findes kun lidt viden om pasningen af *Leiolepis triploida*. Pasningen bygger derfor på *Leiolepis belliana*, den bedst kendte art i slægten. Arten er stor og meget langhalet, så terrariet skal være rummeligt.

TEMPERATUR

Solpladsen skal have en overfladetemperatur på 35-37 °C. Luften i den varme ende er 30-35 °C, og den kølige ende er 26-29 °C. Om natten falder temperaturen til 20-25 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden skal ligge på 30-50 %, og terrariet skal være tørt. Det nederste lag af bunden holdes svagt fugtigt, så hulerne ikke falder sammen, men overfladen må ikke være våd, for det giver skimmel.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og soler sig i åbent land, så den har brug for kraftigt lys og UVB. Brug et rør eller en LED på 6.500 K over hele terrariet og et T5 HO UVB-rør på 10-12 % over solpladsen.

FODER

Kosten er ikke undersøgt for *Leiolepis triploida*. Slægtens arter æder både planter og insekter, og hos flere af dem udgør planterne hovedparten.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Dyret er sky og hurtigt og flygter ned i en hule, når noget bevæger sig. Det tåler dårligt håndtering. Da alle dyr er hunner, er der ikke risiko for kampe mellem hanner.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Thailand og Malaysia.