herpy

AGAMER

Molok

Moloch horridus

Moloch horridus er en lille ørkenagam fra det indre Australien, dækket af kegleformede torne fra snude til halespids. Den lever næsten kun af myrer, drikker ved at suge fugt op gennem huden og går med en karakteristisk vuggende gang. Arten er så specialiseret, at den næsten aldrig holdes, og der findes kun lidt viden om pasningen.

Familie: Agamidae Engelsk: Thorny Devil Tidligere navn: *Acanthosaurus gibbosus*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**15-21 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**30-90 g**
Levetid	**6-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Ørken og halvørken**
Sværhedsgrad	**Ekspert**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 45 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-35 °C**
Hotspot	**38-45 °C**
Temperatur, nat	**15-20 °C**
Luftfugtighed	**10-30 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**3-10 æg**
Kuld pr. år	**1**
Inkubation	**90-132 dage** ved 27-31 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Moloch horridus*, og arten er ikke egnet til privat hold. Årsagen er føden: dyret æder næsten udelukkende myrer og skal have store mængder hver dag.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 25-35 °C med en solplads på 38-45 °C, målt som overfladetemperatur med et infrarødt termometer. Dyret æder kun, når det er over 24 °C, og aktive dyr har en kropstemperatur på omkring 28-33 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være lav, 10-30 %, men dyret skal kunne få fugt gennem huden.
LYS OG UVB	*Moloch horridus* er dagaktiv og lever i fuldt sollys, så den skal have kraftigt lys og UVB svarende til Ferguson-zone 3, fx et T5 HO-rør på 10-12 %. Zonen er valgt ud fra levestedet og andre dagaktive ørkenagamer.
FODER	*Moloch horridus* æder næsten udelukkende myrer, især af slægterne *Iridomyrmex* og *Crematogaster*.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Moloch horridus* er rolig, langsom og ikke aggressiv. Den går med en karakteristisk rykvis gang, hvor den vugger og ofte står helt stille midt i et skridt med en fod løftet.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.