herpy

AGAMER

Grøn vandagam

Physignathus cocincinus

Physignathus cocincinus er en stor, grøn og semi-akvatisk agam fra skovklædte vandløb i Sydøstasien. Den bliver op til ca. 90 cm, hvoraf over to tredjedele er hale. Arten er dagaktiv, klatrer og dykker og kræver et meget stort, højt og fugtigt terrarie med en dyb vanddel, stærk UVB og en varm solplads. En stor del af dyrene i handlen er vildfangne.

Familie: Agamidae Engelsk: Chinese Water Dragon Tidligere navn: *Dilophyrus mentager* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**70-90 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**250-600 g**
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og semi-akvatisk**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**180 × 90 × 180 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Hotspot	**35-40 °C**
Temperatur, nat	**21-24 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vanddel** dybde 15-30 cm
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, planter og hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**5-18 æg**
Inkubation	**60-75 dage** ved 29-31 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag B. Handel over EU's grænse kræver CITES-papirer, og dyrets lovlige oprindelse skal kunne dokumenteres, så få papirer med ved køb. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015). Spørg Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø ved tvivl.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et enkelt voksent dyr skal have et terrarie på mindst 180 × 90 × 180 cm (længde × bredde × højde). Arten er stor og aktiv, klatrer og svømmer, og i et mindre terrarie bliver den stresset og skader sig.

TEMPERATUR
Solpladsen skal være 35-40 °C, målt med et digitalt termometer på selve grenen. Angivelserne svinger fra ca. 32 til ca. 50 °C, og unger klarer sig bedst i den lave ende. Luften i den kølige ende skal være 25-28 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal være 60-80 %, højest om morgenen (ca. 75-80 %) og lavere om aftenen (ca. 50-60 %). Det klares med 1-2 daglige sprøjtninger eller et automatisk regnanlæg, en fugtig bund og en stor vanddel.

VAND OG VANDKVALITET
Vanddelen skal være så stor, at dyret kan dykke og svømme: mindst 15 cm dyb, gerne mere, og den skal dække en tredjedel til halvdelen af bunden. Arten kan ligge længe under vand og sover undertiden i vandet.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og skal have stærk UVB svarende til Ferguson-zone 3. Brug et T5 HO-rør på 10-12 % UVB i et reflekterende armatur på samme side som varmelamperne.

FODER
Physignathus cocincinus er altædende, men lever mest af insekter. Unge dyr æder næsten kun insekter, og med alderen kommer der flere planter til. Unger under 3 måneder: små fårekyllinger hver dag.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Physignathus cocincinus er sky og stressfølsom, især vildfangne dyr. Lad et nyt dyr falde til uden håndtering, og begynd derefter at give foder fra en pincet, så dyret kommer hen til dig.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Kina, Vietnam, Laos, Cambodja og Thailand.