herpy

AGAMER

## Eastern Bearded Dragon

# *Pogona barbata*

*Pogona barbata* er en af de største skægagamer: en kraftig, dagaktiv agam på 50-65 cm fra Australiens østlige skove og krat, med et veludviklet, mørkt skæg og gult mundindre. Den er mere territorial end *Pogona vitticeps*, klatrer gerne og kræver et stort terrarie, kraftig varme og UVB.

Familie: Agamidae  Tidligere navn: *Agama barbata; Amphibolurus barbatus; Grammatophora barbata; Stellio discosomus*  Udgivet 16. november 2026

### SPECIFIKATIONER

#### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **50-65 cm**<br>total længde inkl. hale |
| Levetid | **10-15 år** |
| Aktiv | **Dag** |
| Levevis | **Træboende, jordboende og gravende** |
| Biotop | **Savanne og tempereret skov og eng** |
| Sværhedsgrad | **Øvet** |

#### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **180 × 60 × 60 cm**<br>L × B × H til 1 voksent dyr |
| Temperatur, dag | **22-37 °C** |
| Hotspot | **42-45 °C** |
| Temperatur, nat | **12-24 °C** |
| Luftfugtighed | **30-60 %** |
| Vand | **Vandskål** |
| UVB | **Nødvendig**<br>Ferguson-zone 3 |
| Kost | **Insekter og planter** |
| Holdes | **Enkeltvis** |

#### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Kønsmoden | **12-24 mdr.** |
| Kuldstørrelse | **15-35 æg** |
| Kuld pr. år | **2-3** |
| Inkubation | **55-75 dage**<br>ved 28-30 °C |

#### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ikke omfattet** |
| EU-bilag | **Ikke omfattet** |
| IUCN | **Ikke truet (LC)** |

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

## Pasning i korte træk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Pasningen af *P. barbata* er kun sparsomt beskrevet for arten selv. Tallene for terrarie, temperatur, fugt, lys, foder, levealder og rugning er lånt fra den nært beslægtede *Pogona vitticeps*, som har samme krav og er lidt mindre. |
| **TEMPERATUR** | Opvarm med mindst to halogenspots over solpladsen. Overfladen dér skal være 42-45 °C målt med et infrarødt termometer, og den varme plet skal være mindst lige så stor som hele dyret inklusive halen. |
| **LUFTFUGTIGHED OG VAND** | Luftfugtigheden skal i gennemsnit ligge på 30-60 %, målt i den kølige ende. Den svinger naturligt: lavere ved solpladsen, højere om natten og ved vandet. |
| **LYS OG UVB** | *Pogona barbata* er afhængig af kraftigt, hvidt lys, som fremmer appetit og aktivitet. Terrariet skal være meget lyst, og solpladsen skal være det lyseste sted. |
| **FODER** | *P. barbata* er altædende. I naturen består føden af insekter, orme, små hvirveldyr og plantedele. Unge dyr får mest insekter og voksne mest planter. |
| **ADFÆRD OG HÅNDTERING** | *Pogona barbata* er territorial og viser det tydeligere end *Pogona vitticeps*. Et sort, udspilet skæg, åben mund med det gule indre, hvæsen og et lille hop mod modstanderen er trusler. |
| **OPRINDELIG UDBREDELSE** | Australien. |