herpy

AGAMER

Black-soil Bearded Dragon

Pogona henrylawsoni

Pogona henrylawsoni er den mindste skægagam: en lav, kompakt agam på højst ca. 30 cm fra de træløse sorte lerjordssletter i det centrale Queensland, med et svagt skæg og et kort, stumpt hoved. Den er dagaktiv, rolig og nøjes med langt mindre plads end *Pogona vitticeps*, men har samme behov for varme, kraftig UVB og en gravbar bund og lever 10-15 år.

Familie: Agamidae Tidligere navn: *Pogona brevis* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**25-30 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Halvørken og savanne**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Hotspot	**38-45 °C**
Temperatur, nat	**13-24 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter og planter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**12-24 mdr.**
Kuldstørrelse	**5-19 æg**
Kuld pr. år	**2**
Inkubation	**58-64 dage** ved 29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et enkelt voksent dyr skal have et terrarie på mindst 90 × 45 × 45 cm, og mere plads bliver brugt. En lille gruppe, fx en han med en eller flere hunner, kræver mindst 120 × 60 × 60 cm.

TEMPERATUR
Solpladsen skal have en overfladetemperatur på 38-45 °C, målt med et infrarødt termometer på stenen. Den kølige ende skal være 24-29 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal i gennemsnit ligge på 30-50 %, målt midt i terrariet med et digitalt hygrometer. Korte udsving op eller ned er ufarlige. Stillestående luft og våd bund giver sygdom, så terrariet skal være godt ventileret.

LYS OG UVB
P. henrylawsoni er dagaktiv og skal have meget, klart hvidt lys og kraftig UVB. Brug et T5 HO-rør på 10-12 % UVB i et reflekterende armatur på samme side som varmelampen.

FODER
P. henrylawsoni er altædende og æder mest insekter og bladgrønt. Nyklækkede (under 3 måneder): insekter 2-3 gange dagligt og grønt dagligt. Unge (3-7 måneder): insekter to gange dagligt og grønt dagligt.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
P. henrylawsoni er rolig og tåler forsigtig håndtering, men bryder sig ikke om at blive holdt fast eller vendt om på ryggen og sprætter, hvis det sker.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Australien.