herpy

AGAMER

## Kimberley Bearded Dragon

# *Pogona microlepidota*

*Pogona microlepidota* er en stor, dagaktiv skægagam med et lille, smalt hoved, en bred, flad krop og flere rækker store pigge langs kroppens sider. Den lever kun i den nordvestlige del af Kimberley i Western Australia, og der findes næsten ingen pasningserfaringer. Vejledningen bygger på de nærmeste slægtninge.

Familie: Agamidae  Tidligere navn: *Amphibolurus barbatus microlepidotus; Amphibolurus microlepidotus; Uxoriousauria microlepidota*

### SPECIFIKATIONER

#### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **45-55 cm**<br>total længde inkl. hale |
| Levetid | **10-15 år** |
| Aktiv | **Dag** |
| Levevis | **Jordboende og gravende** |
| Biotop | **Savanne** |
| Sværhedsgrad | **Øvet** |

#### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **150 × 60 × 60 cm**<br>L × B × H til 1 voksent dyr |
| Temperatur, dag | **24-37 °C** |
| Hotspot | **40-45 °C** |
| Temperatur, nat | **18-24 °C** |
| Luftfugtighed | **30-60 %** |
| Vand | **Vandskål** |
| UVB | **Nødvendig**<br>Ferguson-zone 3 |
| Kost | **Insekter og planter** |
| Holdes | **Enkeltvis** |

#### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Kuldstørrelse | **5-19 æg** |
| Inkubation | **58-64 dage**<br>ved 29 °C |

#### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ikke omfattet** |
| EU-bilag | **Ikke omfattet** |
| IUCN | **Ikke truet (LC)** |

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

## Pasning i korte træk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Der findes kun lidt viden om pasningen af *Pogona microlepidota*, og arten er ikke beskrevet fra fangenskab. |
| **TEMPERATUR** | Opvarm med mindst to halogenspots over solpladsen. Overfladen dér skal være 40-45 °C målt med et infrarødt termometer, og den varme plet skal være mindst lige så stor som hele dyret. |
| **LUFTFUGTIGHED OG VAND** | Luftfugtigheden skal ligge på 30-60 %, målt i den kølige ende. Arten kommer fra et fugtigere klima end de øvrige skægagamer, men terrariet skal stadig kunne tørre op: stillestående, våd luft og våd bund giver sygdom. |
| **LYS OG UVB** | *Pogona microlepidota* er dagaktiv og skal have kraftigt, hvidt lys. Solpladsen skal være det lyseste sted, og 75-100 % af terrariets længde bør være oplyst. |
| **FODER** | *Pogona microlepidota* fodres som *Pogona minor*: mest insekter og en mindre del grønt. Nyklækkede (under 3 måneder): insekter 2-3 gange dagligt og grønt dagligt. Unge (3-12 måneder): insekter og grønt dagligt. |
| **ADFÆRD OG HÅNDTERING** | *Pogona microlepidota* er dagaktiv og soler sig meget. Kropssproget kendes fra andre skægagamer: hovednik over for rivaler og vinkning med et forben som tegn på underkastelse. |
| **OPRINDELIG UDBREDELSE** | Australien. |

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/agamer/pogona-microlepidota