herpy

AGAMER

Abrolhos Bearded Dragon

Pogona minima

Pogona minima er en lille, dagaktiv skægagam, der kun lever på Wallabi-øerne i Houtman Abrolhos ud for Western Australias kyst. Den er omkring 11 cm fra snude til kloak, har lange ben og hale og kun et svagt skæg. Der findes næsten ingen pasningserfaringer, så vejledningen bygger på de nærmeste slægtninge.

Familie: Agamidae Tidligere navn: *Amphibolurus barbatus minimus; Amphibolurus minimus; Pogona minor minima*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**25-30 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Halvørken**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-37 °C**
Hotspot	**40-45 °C**
Temperatur, nat	**13-24 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter og planter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**5-19 æg**
Inkubation	**58-64 dage** ved 29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke vurderet (NE)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter. IUCN har ikke vurderet arten.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Der findes kun lidt viden om pasningen af *Pogona minima*, og arten er næsten ikke beskrevet fra fangenskab. Tallene for terrarie, temperatur, fugt, lys, foder og levealder er lånt fra *Pogona minor* og *Pogona vitticeps*.

TEMPERATUR

Opvarm med mindst to halogenspots over solpladsen. Overfladen dér skal være 40-45 °C målt med et infrarødt termometer, og den varme plet skal være mindst lige så stor som hele dyret.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden skal ligge på 30-50 %, målt i den kølige ende, og terrariet skal kunne tørre op. Stillestående, våd luft og våd bund giver sygdom. Er fugten konstant for høj, hjælper en lille blæser over nettet i den kølige ende.

LYS OG UVB

Pogona minima er dagaktiv og skal have kraftigt, hvidt lys. Solpladsen skal være det lyseste sted, og 75-100 % af terrariets længde bør være oplyst. UVB er nødvendig, og arten regnes som slægtens øvrige arter for Ferguson-zone 3.

FODER

Pogona minima fodres som *Pogona minor*: mest insekter og en mindre del grønt. Nyklækkede (under 3 måneder): insekter 2-3 gange dagligt og grønt dagligt. Unge (3-12 måneder): insekter og grønt dagligt.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Pogona minima er dagaktiv og soler sig meget. Kropssproget kendes fra andre skægagamer: hovednik over for rivaler og vinkning med et forben som tegn på underkastelse. Skægvisningen er svag, fordi skægget er lidt udviklet.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Australien.