herpy

AGAMER

Western Bearded Dragon

Pogona minor

Pogona minor er en mellemstor, forholdsvis slank og dagaktiv skægagam på 30-40 cm fra det sydvestlige og centrale Australien, med kun et svagt skæg af små pigge. Den lever i klitter, krat og tørre skove, æder mest insekter og lægger flere små kuld æg om året.

Familie: Agamidae Tidligere navn: *Amphibolurus minor; Pogona loriae* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**30-40 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Halvørken og savanne**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-37 °C**
Hotspot	**40-45 °C**
Temperatur, nat	**13-24 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter og planter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**5-19 æg**
Kuld pr. år	**2-4**
Inkubation	**58-64 dage** ved 29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Pasningen af *P. minor* er kun sparsomt beskrevet. Tallene for terrarie, temperatur, fugt, lys, foder og levealder er lånt fra *Pogona vitticeps* og den mindre *Pogona henrylawsoni*.

TEMPERATUR

Opvarm med mindst to halogenspots over solpladsen. Overfladen dér skal være 40-45 °C målt med et infrarødt termometer, og den varme plet skal være mindst lige så stor som hele dyret.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden skal ligge på 30-50 %, målt i den kølige ende, og terrariet skal kunne tørre op, for arten lever i tørre egne. Stillestående, våd luft og våd bund giver sygdom.

LYS OG UVB

Pogona minor er afhængig af kraftigt, hvidt lys, som fremmer appetit og aktivitet. Solpladsen skal være det lyseste sted, og 75-100 % af terrariets længde bør være oplyst.

FODER

Pogona minor er mest insektæder. I naturen udgør insekter og andre smådyr omkring 80 % af føden og plantedele omkring en femtedel. Nyklækkede (under 3 måneder): insekter 2-3 gange dagligt og grønt dagligt.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Pogona minor er dagaktiv og soler sig meget. Dyret bruger kropssprog som andre skægagamer: Hannerne nikker med hovedet over for rivaler, og vinkning med et forben er et tegn på underkastelse.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Australien.