herpy

AGAMER

North-west Bearded Dragon

Pogona mitchelli

Pogona mitchelli er en slank, dagaktiv skægagam på omkring 40 cm fra det tropiske nordvestlige Australien, med et svagt skæg og kraftigere pigge i nakken end *Pogona minor*. Pasningen følger de nærmeste slægtninge: varme, kraftig UVB, gravbar bund og mest insekter.

Familie: Agamidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**30-40 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Savanne**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-37 °C**
Hotspot	**40-45 °C**
Temperatur, nat	**18-24 °C**
Luftfugtighed	**30-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter og planter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**5-19 æg**
Kuld pr. år	**2-4**
Inkubation	**58-64 dage** ved 29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke vurderet (NE)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Pogona mitchelli*. Klimaet i udbredelsesområdet er varmt hele året med en kort regntid og en lang, tør periode med kølige nætter.
TEMPERATUR	Opvarm med mindst to halogenspots over solpladsen. Overfladen dér skal være 40-45 °C målt med et infrarødt termometer, og den varme plet skal være mindst lige så stor som hele dyret.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal ligge på 30-60 %, målt i den kølige ende, og terrariet skal kunne tørre op mellem sprøjtningerne.
LYS OG UVB	*Pogona mitchelli* er dagaktiv og skal have meget klart, hvidt lys og kraftig UVB. Brug et T5 HO-rør på 10-14 % UVB i et reflekterende armatur over den varme side, parallelt med varmelamperne.
FODER	Føden hos *Pogona mitchelli* er ikke dokumenteret. *P. minor* er mest insektæder, og foderplanen er lånt derfra: Nyklækkede (under 3 måneder): insekter 2-3 gange dagligt og grønt dagligt.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Pogona mitchelli* er dagaktiv og soler sig meget. Som andre skægagamer bruger den kropssprog: Hannerne nikker med hovedet over for rivaler og hunner, og vinkning med et forben er et tegn på underkastelse. Skægvisningen er svag.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.