herpy

AGAMER

Nullabor Bearded Dragon

Pogona nullarbor

Pogona nullarbor er en mellemstor skægagam på omkring 30-35 cm med kort snude og kort hale, kun kendt fra Nullarbor-sletten i det sydlige Australien. Den er rødbrun til orangebrun med lyse tværbånd og flere rækker store pigge langs siderne, og den holdes meget sjældent i terrarium.

Familie: Agamidae Tidligere navn: *Amphibolurus nullarbor*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**30-35 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Halvørken og savanne**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-37 °C**
Hotspot	**40-45 °C**
Temperatur, nat	**13-24 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter og planter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**6-12 mdr.**
Kuldstørrelse	**14-20 æg**
Inkubation	**75-85 dage** ved 28-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Pogona nullarbor*, fordi arten næsten ikke holdes uden for Australien.
TEMPERATUR	Opvarm med mindst to halogenspots over solpladsen. Overfladen dér skal være 40-45 °C målt med et infrarødt termometer, og den varme plet skal være mindst lige så stor som hele dyret.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal ligge på 30-50 %, målt i den kølige ende, og terrariet skal kunne tørre op, for arten lever i et tørt område. Stillestående, våd luft og våd bund giver sygdom.
LYS OG UVB	*Pogona nullarbor* er afhængig af kraftigt, hvidt lys, som fremmer appetit og aktivitet. Solpladsen skal være det lyseste sted, og 75-100 % af terrariets længde bør være oplyst.
FODER	*Pogona nullarbor* fodres som andre mellemstore skægagamer: mest insekter og et dagligt tilskud af grønt. Fødevalget i naturen er ikke dokumenteret for arten.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Pogona nullarbor* er dagaktiv og soler sig meget. Adfærden er ikke undersøgt for arten; slægtens øvrige arter nikker med hovedet over for rivaler og vinker med et forben som tegn på underkastelse, og det samme kan forventes her.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/agamer/pogona-nullarbor