herpy

AGAMER

## Hardun

# *Stellagama stellio*

*Stellagama stellio* er en kraftig, tornet klippeagam fra det østlige Middelhavsområde, grå til brun med lyse, stjerneformede pletter og en hale i tydelige ringe. Den er dagaktiv, klatrer godt, æder både insekter og planter og bliver 30-35 cm. Den skal have et tørt terrarie med en meget varm solplads, UVB og masser af sten at gemme sig i.

Familie: Agamidae  Engelsk: Roughtail Rock Agama  Tidligere navn: *Laudakia stellio; Agama stellio; Stellio stellio*  Udgivet 16. november 2026

## SPECIFIKATIONER

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **30-35 cm**<br>total længde inkl. hale |
| Levetid | **10-15 år** |
| Aktiv | **Dag** |
| Levevis | **Træboende, klippeboende og jordboende** |
| Biotop | **Halvørken og klippeterræn** |
| Sværhedsgrad | **Øvet** |

### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **100 × 50 × 50 cm**<br>L × B × H til 1 voksent dyr |
| Temperatur, dag | **21-30 °C** |
| Hotspot | **40-46 °C** |
| Temperatur, nat | **17-20 °C** |
| Luftfugtighed | **15-35 %** |
| Vand | **Vandskål** |
| UVB | **Nødvendig**<br>Ferguson-zone 3 |
| Kost | **Insekter og planter** |
| Holdes | **Enkeltvis eller parvis** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Kuldstørrelse | **4-10 æg** |
| Inkubation | **60-90 dage**<br>ved 26-30 °C |

### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ikke omfattet** |
| EU-bilag | **Ikke omfattet** |
| IUCN | **Ikke truet (LC)** |

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's bilag, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

## Pasning i korte træk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 100 × 50 × 50 cm (længde × bredde × højde). Et par eller en han med et par hunner skal have mindst 120 × 60 × 60 cm. |
| **TEMPERATUR** | *Stellagama stellio* skal have en tydelig gradient. Solstenen skal have en overfladetemperatur på 40-46 °C, målt med et infrarødt termometer, mens den kølige ende ligger på 21-29 °C. |
| **LUFTFUGTIGHED OG VAND** | Luftfugtigheden om dagen skal ligge på 15-35 %. Sprøjt væggene let om morgenen, så dyret kan drikke dråber, for agamer drikker gerne dråber frem for af en skål. |
| **LYS OG UVB** | *Stellagama stellio* er dagaktiv og soler sig meget, så den skal have kraftigt lys og UVB svarende til Ferguson-zone 3. Brug et T5 HO-rør på 10-12 % i en reflekterende armatur i samme side som varmelampen. |
| **FODER** | *Stellagama stellio* er altædende, men insekter udgør den største del af kosten. |
| **ADFÆRD OG HÅNDTERING** | *Stellagama stellio* er sky og hurtig, men tåler som regel rolig håndtering. Tag aldrig dyret oppefra; løft det nedefra, og støt krop og ben. Lad helst dyret selv kravle op på hånden, og tag det aldrig ud af et gemmested. |
| **OPRINDELIG UDBREDELSE** | Grækenland, Tyrkiet og Jordan. |

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/agamer/stellagama-stellio