herpy

AGAMER

## North-African Mastigure

# *Uromastyx acanthinura*

*Uromastyx acanthinura* er en kraftig tornhale fra de stenede og grusede dele af den nordlige Sahara. Den bliver 30-43 cm og vejer omkring 450 g, graver dybe huler og lever mest af planter. Den kræver et stort, varmt og tørt terrarie med dyb bund og kraftig UVB, og den kan leve i mere end 20 år. Arten er territorial og holdes alene.

Familie: Agamidae  Udgivet 16. november 2026

### SPECIFIKATIONER

#### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **30-43 cm**<br>total længde inkl. hale |
| Levetid | **15-24 år** |
| Aktiv | **Dag** |
| Levevis | **Klippeboende, jordboende og gravende** |
| Biotop | **Ørken, halvørken og klippeterræn** |
| Sværhedsgrad | **Øvet** |

#### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **120 × 60 × 60 cm**<br>L × B × H til 1 voksent dyr |
| Temperatur, dag | **27-32 °C** |
| Hotspot | **50-55 °C** |
| Temperatur, nat | **18-22 °C** |
| Luftfugtighed | **20-30 %** |
| Vand | **Vandskål** |
| UVB | **Nødvendig**<br>Ferguson-zone 3 |
| Vinterhvile | **16-22 °C**<br>8-12 uger |
| Kost | **Planter** |
| Holdes | **Enkeltvis** |

#### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Kønsmoden | **48 mdr.** |
| Kuldstørrelse | **6-23 æg** |
| Kuld pr. år | **1** |
| Inkubation | **56-84 dage**<br>ved 33-34 °C |

#### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Appendiks II** |
| EU-bilag | **Bilag B** |
| IUCN | **Næsten truet (NT)** |

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag B (forordning 338/97) som alle arter af Uromastyx. Handel over grænser kræver CITES- og EU-dokumenter. Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015). Bed sælger om dokumentation for dyrets herkomst.

## Pasning i korte træk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 120 × 60 × 60 cm (længde × bredde × højde), og større er bedre, fx 150 × 60 × 60 cm til et stort dyr. Almindelige glasterrarier er for små. |
| **TEMPERATUR** | Solpladsen skal have en overfladetemperatur på 50-55 °C, målt med et infrarødt termometer lige under lampen. Den kølige side skal være 27-32 °C. |
| **LUFTFUGTIGHED OG VAND** | Luftfugtigheden i terrariet skal være lav: omkring 20-30 %, målt ved bunden i den kølige side. Vedvarende høj luftfugtighed gør dyret sygt, så sprøjt ikke terrariet. |
| **LYS OG UVB** | Arten er dagaktiv og kræver kraftigt lys. Brug en LED-lampe eller et lysstofrør på ca. 6500 K som dagslys ud over varmelampen. |
| **FODER** | Voksne dyr er næsten rene planteædere. |
| **ADFÆRD OG HÅNDTERING** | Arten er udpræget territorial: begge køn forsvarer deres område, og i kampe bider dyrene hinanden i siderne, så der kan opstå hvide ar. Selv kuldsøskende angriber hinanden, hvis de holdes sammen for længe. |
| **OPRINDELIG UDBREDELSE** | Algeriet, Tunesien og Libyen. |