herpy

AGAMER

Moroccan Spiny-tailed Lizard

Uromastyx nigriventris

Uromastyx nigriventris er en kraftig og farverig tornhale fra stenørkenerne øst og syd for Atlasbjergene i Marokko og i det vestlige Algeriet. Voksne dyr har som regel sort grundfarve med gule, grønne og orange tegninger. Den bliver op til 42 cm, lever næsten kun af planter og graver dybe huler. Den kræver et stort, varmt og tørt terrarie med dyb bund og kraftig UVB, og den holdes alene.

Familie: Agamidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**30-42 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-25 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Klippeboende, jordboende og gravende**
Biotop	**Ørken, halvørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Hotspot	**50-55 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**20-30 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Vinterhvile	**16-22 °C** 8-12 uger
Kost	**Planter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**48 mdr.**
Kuldstørrelse	**10-15 æg**
Inkubation	**56-84 dage** ved 33-34 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag B (forordning 338/97) som alle arter af Uromastyx. Handel over grænser kræver CITES- og EU-dokumenter, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Ingen agamer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015). Bed sælger om dokumentation for dyrets herkomst.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 120 × 60 × 60 cm (længde × bredde × højde), og større er bedre.
TEMPERATUR	Solpladsen skal have en overfladetemperatur på 50-55 °C, målt med et infrarødt termometer lige under lampen. Den kølige side ligger på 27-32 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være lav, 20-30 %, målt ved bunden i den kølige side. Vedvarende høj luftfugtighed gør dyret sygt, så sprøjt ikke terrariet.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og har brug for kraftigt lys. Brug en LED-lampe eller et lysstofrør på ca. 6500 K som dagslys, adskilt fra varmen.
FODER	*Uromastyx nigriventris* er planteæder. Omkring 90 % af føden skal være bladgrønt og blomster, ca. 5 % hårde grøntsager og ca. 5 % tørfoder.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Voksne dyr er territoriale, og i naturen holder kun ét voksent dyr til ved hver stendynge. Hold derfor dyret alene. Unger fra samme kuld bliver aggressive over for hinanden og skal adskilles, før de nærmer sig kønsmodenhed.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Marokko og Algeriet.