herpy

FIRBEN

Fringe-fingered Lizard

Acanthodactylus erythrurus

Acanthodactylus erythrurus er et hurtigt, slankt firben fra Iberia og Nordvestafrika med lange, frynsede tæer, brun og grå tegning og en rødlig hale hos unger og hunner i parringstiden. Arten bliver 18-23 cm, lever af insekter og kræver en dyb sandbund, kraftigt sollys og høj varme.

Familie: Lacertidae Udgivet 17. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**18-23 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-8 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Halvørken og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**100 × 50 × 40 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-35 °C**
Hotspot	**40-45 °C**
Temperatur, nat	**15-22 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 3
Vinterhvile	**10-15 °C** 8-12 uger
Kost	**Insekter**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**10-18 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-8 æg**
Kuld pr. år	**1-2**
Inkubation	**35-60 dage** ved 25-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES eller i EU's handelsbilag og er ikke blandt de arter, private ikke må holde efter BEK nr. 1261 af 17.11.2015. Mange europæiske firben er fredet efter EU's habitatdirektiv. Køb kun opdrættede dyr, og bed om dokumentation for herkomsten.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Acanthodactylus erythrurus*.
TEMPERATUR	*Acanthodactylus erythrurus* er meget varmeelskende: aktive voksne dyr holder i naturen en kropstemperatur på 32-38 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal ligge på 30-50 %, som på det tørre, åbne levested. Sandet skal være tørt, og kun sandet i lægekassen holdes fugtigt, mens terrariet i øvrigt holdes veludluftet.
LYS OG UVB	*Acanthodactylus erythrurus* er dagaktiv og soler sig meget, så terrariet skal have kraftigt lys og UVB.
FODER	*Acanthodactylus erythrurus* æder insekter og andre små leddyr, i naturen især myrer. Giv en varieret kost: små fårekyllinger, græshopper, melorme, kakerlakker, fluer, silkeorme og edderkopper, i størrelser, dyret kan sluge hele.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Acanthodactylus erythrurus* er hurtigt, vagtsomt og sky. Det graver sig ned i sandet ved fare og er svært at få fat på. Undgå at gribe dyret; halen kastes af ved stress. Hannerne er territoriale og kæmper om pladsen.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Spanien, Portugal, Gibraltar, Marokko og Algeriet.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/firben/acanthodactylus-erythrurus