herpy

FIRBEN

Broadley's Rough-scaled Plated Lizard

Broadleysaurus major

Broadleysaurus major er et kraftigt, pansret firben fra Afrikas savanner og klippeland, med tykke, kølede skæl i tværgående bånd, en stump snude og en hale, der udgør under halvdelen af den samlede længde. Den er dagaktiv og nysgerrig, men bryder sig ikke om håndtering. Den skal have et stort terrarie med dyb gravebund, varme solpladser, UVB og en kost af insekter, planter og lidt frugt.

Familie: Gerrhosauridae Tidligere navn: *Gerrhosaurus major*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**30-60 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Klippeboende, jordboende og gravende**
Biotop	**Savanne og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**23-26 °C**
Hotspot	**40-46 °C**
Temperatur, nat	**15-22 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, frugt og planter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**2-3 æg**
Inkubation	**110-145 dage** ved 28-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står ikke på CITES-listerne eller i EU's bilag A-D, og den står ikke på listen over arter, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015). De almindelige regler om dyrevelfærd gælder. Spørg sælger om dyrets herkomst.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 120 × 60 × 60 cm (længde × bredde × højde). Større er bedre, for arten er meget aktiv og dækker store områder i naturen.

TEMPERATUR
Solpladsen skal have en overfladetemperatur på 40-46 °C, målt med et infrarødt termometer. Den kølige ende er 23-26 °C, og om natten falder temperaturen til 15-22 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Den relative luftfugtighed i terrariet ligger på 40-60 %, men terrariet skal have et tørt område på 20-40 % og et fugtigt område på 50-80 %. Luften skal være forholdsvis tør, mens dyret skal have fri adgang til en fugtig hule.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og kræver UVB. Uden UVB bliver dyret sygt. UVB-røret skal være et T5 HO på 10-14 %, i et armatur der dækker omkring halvdelen af terrariets længde, på samme side som varmepærerne.

FODER
Arten er altædende og lever mest af insekter, men spiser også planter, blomster og frugt, og voksne dyr lever af en større del planter. Ungerne har brug for flere energirige insekter og små dyr.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
B. major er aktiv og nysgerrig, men også nervøs og let at skræmme. Unger er særligt sky og defensive. Dyret bider sjældent, men pisker med halen, når det bliver grebet.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Kenya, Tanzania, Mozambique, Malawi, Zambia, Etiopien, Eritrea, Djibouti, Togo, Congo-Kinshasa, Sydafrika, Eswatini, Botswana, Zimbabwe, Sydsudan, Den Centralafrikanske Republik, Somalia, Uganda, Cameroun, Nigeria, Benin og Ghana.