herpy

FIRBEN

Crocodile Tegu

Crocodilurus amazonicus

Crocodilurus amazonicus er et halvt vandlevende firben fra Amazonas og Orinoco med en lang, sammentrykt svømmehale og forlængede tæer. Det bliver omkring 50-60 cm, fanger insekter, krebsdyr, fisk og frøer i og ved vandet og soler sig på grene over vandkanten. Arten kræver et varmt, fugtigt paludarium med en stor vanddel og en erfaren holder.

Familie: Teiidae Tidligere navn: *Crocodilurus lacertinus; Tupinambis lacertinus*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**50-60 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**8-12 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Semi-akvatisk**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 90 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-31 °C**
Hotspot	**35-38 °C**
Temperatur, nat	**23-26 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Vanddel** dybde 15-25 cm
Vandtemperatur	**25-29 °C**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter, hvirveldyr og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**2-6 æg**
Inkubation	**90-120 dage** ved 27-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag B. Handel over grænser kræver derfor CITES- og EU-dokumenter, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Arten står ikke på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015). Spørg sælger om dokumentation for dyrets herkomst.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun begrænset viden om pasningen af *Crocodilurus amazonicus*, og arten holdes sjældent i fangenskab; opdræt er næsten ikke beskrevet.
TEMPERATUR	Om dagen skal luften være 27-31 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være 70-90 %. Vanddelen, planterne og en fugtig bund holder på fugten, og et tågeanlæg eller et regnanlæg, der kører et par gange om dagen i 10 minutter, giver en jævn fugt.
VAND OG VANDKVALITET	Dyret er en dygtig svømmer og skal kunne ligge i vandet og dykke helt under.
LYS OG UVB	*Crocodilurus amazonicus* er dagaktiv og soler sig, så den skal have lys, UVA og UVB 12 timer om dagen.
FODER	I naturen æder *Crocodilurus amazonicus* mest vandlevende leddyr (insekter, krebsdyr og edderkopper), men også fisk og frøer.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Crocodilurus amazonicus* er et hurtigt, sky dyr, som flygter ved den mindste forstyrrelse: ud i vandet og ned i et skjul.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Brasilien, Colombia, Venezuela, Peru og Fransk Guyana.