herpy

FIRBEN

Atlantic Lizard

Gallotia atlantica

Gallotia atlantica er et lille, dagaktivt firben fra Lanzarote, Fuerteventura og de omkringliggende øer. Hannerne bliver op til 29 cm og har store blå pletter på flankerne. Arten er indbyrdes aggressiv og passes bedst som par i et tørt, solrigt terrarie med mange skjul og en kølig vinterhvile. Ungerne er sarte og opdrættes hver for sig.

Familie: Lacertidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**20-29 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Klippeboende og jordboende**
Biotop	**Halvørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**80 × 40 × 40 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-31 °C**
Hotspot	**35-45 °C**
Temperatur, nat	**15-21 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 3
Vinterhvile	**12-15 °C** 8-9 uger
Kost	**Insekter, frugt og planter**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-5 æg**
Kuld pr. år	**1-3**
Inkubation	**64-87 dage** ved 28-31 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Alle *Gallotia*-arter undtagen *G. simonyi* er fra 29.6.2026 optaget i EU's bilag C ved forordning (EU) 2026/1383, hvor de står som CITES liste III efter indstilling fra EU. Arten står på bilag IV i EU's habitatdirektiv. Efter artsfredningsbekendtgørelsen (BEK nr. 521/2021, § 11) må dyr indsamlet i naturen derfor ikke holdes, handles, overdrages eller udstilles i Danmark. Opdrættet afkom af lovligt erhvervede dyr er undtaget (§ 2), men ejeren skal kunne godtgøre, at dyret ikke stammer fra naturen (§ 20). Arten er ikke blandt de arter, private ikke må holde efter BEK nr. 1261 af 17.11.2015.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Gallotia atlantica færdes mest på jorden, så bundarealet er vigtigere end højden. Et par skal have et terrarie på mindst 80 × 40 × 40 cm (længde × bredde × højde).

TEMPERATUR

Dagtemperaturen i terrariet er 25-31 °C, og en spotlampe over en flad sten giver en overfladetemperatur på 35-45 °C, målt med et infrarødt termometer. Om natten falder temperaturen til 15-21 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Terrariet er tørt, med en luftfugtighed på omkring 30-50 %, og har ingen fugtige zoner ud over æglægningsbeholderen. Stil en lav skål med frisk vand, som altid er fyldt og skiftes jævnligt. Ventilationen skal være god.

LYS OG UVB

Gallotia atlantica er dagaktiv og soler sig i flere timer, så terrariet skal have kraftigt lys. Brug et T5-rør til Ferguson-zone 3 over solpladsen, så dyret får et UV-indeks på 3-5 ved hovedet; afstanden afgøres med en UV-måler.

FODER

Gallotia atlantica er altædende. Giv mest insekter: fluelarver, fårekyllinger, mel- og zophobasorme, kakerlakker og små græshopper, støvet med kalk. Frugt og grønt tilbydes i små mængder, for arten æder frugt i naturen.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Gallotia atlantica er sky og flygter hurtigt, når nogen kommer ind i rummet, og den bør ikke gribes. Halen kastes af ved stress og vokser ud igen uden nye hvirvler. Hannerne er voldsomt territoriale.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Spanien.