herpy

FIRBEN

Markfirben

Lacerta agilis

Lacerta agilis er et kraftigt, kortbenet og dagaktivt firben fra sandede heder, klitter og solvendte skrænter. Arten lever fra Sydengland til Baikalsøen, og hannen får skinnende grønne flanker i parringstiden. Den bliver omkring 20 cm, lever af insekter og kræver sol, en kold vinterhvile og helst en udendørs indhegning.

Familie: Lacertidae Engelsk: Sand Lizard Udgivet 17. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**15-25 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**6-12 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-30 °C**
Hotspot	**38-45 °C**
Temperatur, nat	**12-17 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Vinterhvile	**4-6 °C** 4-16 uger
Kost	**Insekter**
Holdes	**Parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**24-36 mdr.**
Kuldstørrelse	**4-15 æg**
Kuld pr. år	**1-2**
Inkubation	**40-45 dage** ved 24-25 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Fredet i Danmark (BEK nr. 521 af 25.3.2021, bilag 1, ændret ved BEK nr. 1005 af 2.7.2025; administreres af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø): vildtlevende dyr må ikke fanges eller dræbes. Hjemmehørende dyr fra naturen må ikke tages til terrarium. Arten står ikke på CITES eller i EU's handelsbilag. Opdrættet afkom af lovligt erhvervede dyr er undtaget (§ 2 nr. 2), men ejeren skal kunne godtgøre oprindelsen (§ 20).

Pasning i korte træk

TERRARIET
Lacerta agilis trives bedst i et udendørs terrarie eller en indhegning i fuld sol, hvor dyret får naturligt sollys, naturlig døgn- og årsrytme og levende bytte. Et par kan holdes i en indhegning på 2 × 1 m.

TEMPERATUR
Lacerta agilis er et solelskende dyr. Dagtemperaturen i terrariet ligger på 22-30 °C, og solpladsen skal have en overfladetemperatur på 38-45 °C, målt med et infrarødt termometer.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Lacerta agilis kommer fra tørre, åbne levesteder, og luftfugtigheden i terrariet ligger på 40-60 %. God ventilation er vigtigere end fugt, og bunden må ikke være konstant våd. I naturen får dyret væske fra morgendug og regn.

LYS OG UVB
Lacerta agilis soler sig størstedelen af dagen og skal have kraftigt lys og UVB. Udendørs kommer UVB fra solen. Indendørs bruges T5-HO-rør med UVB over solpladsen, så lys, varme og UVB dækker samme område og er jævnt fordelt.

FODER
Lacerta agilis er insektæder. I naturen består kosten af biller og deres larver, græshopper, fårekyllinger, edderkopper, sommerfuglelarver, bænkebidere og fluer. Myrer undgås.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Lacerta agilis er en enlig art, der kun mødes med artsfæller for at parre sig. Hannerne er territoriale og jager rivaler væk fra de bedste solpladser. Et par eller en han med to hunner pr. kvadratmeter er en rolig holdform.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Storbritannien, Frankrig, Andorra, Danmark, Sverige, Norge, Finland, Nederlandene, Belgien, Luxembourg, Tyskland, Schweiz, Liechtenstein, Østrig, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Polen, Italien, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro, Nordmakedonien, Albanien, Bulgarien, Grækenland, Rumænien, Moldova, Ukraine, Belarus, Litauen, Letland, Estland, Rusland, Georgien, Armenien, Aserbajdsjan, Tyrkiet, Kasakhstan, Kirgisistan, Mongoliet og Kina.