herpy

FIRBEN

Western Green Lizard

Lacerta bilineata

Lacerta bilineata er et stort, slankt og dagaktivt firben fra Vesteuropas varme, solrige skråninger og buskads, med grøn krop, sorte pletter og en hale, der udgør to tredjedele af længden. Arten bliver 25-40 cm, lever af insekter og andre smådyr og kræver sol, et stort terrarie eller et udendørs terrarie og en kold vinterhvile.

Familie: Lacertidae Udgivet 17. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**25-40 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**30-45 g**
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Klippeboende og jordboende**
Biotop	**Klippeterræn og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**150 × 60 × 75 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-30 °C**
Hotspot	**38-45 °C**
Temperatur, nat	**12-18 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 3
Vinterhvile	**4-6 °C** 8-12 uger
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**5-23 æg**
Kuld pr. år	**1-3**
Inkubation	**45-80 dage** ved 28-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES eller i EU's bilag A-D og er ikke blandt de arter, private ikke må holde efter BEK nr. 1261 af 17.11.2015. Mange europæiske firben er fredet efter EU's habitatdirektiv, så dyr til terrarier skal være lovligt opdrættede. Køb kun opdrættede dyr, og få dokumentation for oprindelsen med.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Lacerta bilineata er stor og aktiv, klatrer gerne og bruger hele rummet. Et par eller en han med to hunner skal have et indendørs terrarie på mindst 150 × 60 × 75 cm (længde × bredde × højde), og større er bedre.

TEMPERATUR
Lacerta bilineata er solelsker.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal ligge på 40-60 %, med en lidt fugtigere og en tør del, så dyrene selv kan vælge. Terrariet skal have god ventilation, og bunden må ikke være konstant våd, for det giver hudproblemer og mider.

LYS OG UVB
Lacerta bilineata er dagaktiv og soler sig flere timer hver dag, så den skal have kraftigt lys og UVB. Udendørs kommer UVB fra solen.

FODER
Lacerta bilineata lever af biller, græshopper, larver, fluer, natsommerfugle, edderkopper, regnorme, bænkebidere, snegle og andre smådyr, og store dyr tager også små firben. Nyfødte mus tages af og til, men er ikke nødvendige.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Lacerta bilineata er hurtig, vagtsom og sky. Et nyt dyr er længe om at falde til og gemmer sig ved hver nærmelse indtil da. Fodring med pincet gør dyret trygt. Undgå at gribe fat i det, for halen kastes ved stress.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Spanien, Andorra, Frankrig, Monaco, Schweiz, Italien, San Marino, Slovenien, Kroatien og Tyskland.