herpy

FIRBEN

Stort smaragdfirben

Lacerta trilineata

Lacerta trilineata er et af Europas største firben: et kraftigt, dagaktivt og grønt dyr fra Balkan og Grækenlands varme krat og klippeskrænter. Arten bliver 40-60 cm, hvoraf halen er omkring to tredjedele. Den lever af store insekter og lidt frugt, kræver sol, UVB og et stort terrarie og skal have en kølig vinterhvile.

Familie: Lacertidae Engelsk: Balkan Emerald Lizard Udgivet 17. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**40-60 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**8-12 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Klippeboende og jordboende**
Biotop	**Klippeterræn og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**150 × 70 × 100 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**23-28 °C**
Hotspot	**38-42 °C**
Temperatur, nat	**15-20 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 3
Vinterhvile	**5-7 °C** 8-10 uger
Kost	**Insekter, frugt og orme/snegle**
Holdes	**Parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**5-20 æg**
Kuld pr. år	**1-3**
Inkubation	**80-85 dage** ved 27-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES eller i EU's handelsbilag og er ikke blandt de arter, private ikke må holde efter BEK nr. 1261 af 17.11.2015. Mange europæiske firben er fredet efter EU's habitatdirektiv. Køb kun opdrættede dyr, og bed om dokumentation for herkomsten.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Lacerta trilineata er et stort og aktivt firben, der kræver et stort terrarie. Et par eller en han med to-tre hunner skal have mindst 150 × 70 × 100 cm (længde × bredde × højde), og større er altid bedre.

TEMPERATUR

Lacerta trilineata er et solelskende dyr. Under spotten skal solpladsen nå en overfladetemperatur på 38-42 °C, målt med et infrarødt termometer; med en kraftig spot ligger solpladsen omkring 30 cm under lampen.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Lacerta trilineata kommer fra tørre, solrige levesteder, og luftfugtigheden ligger på 40-60 %. God ventilation er vigtigere end fugt. Stil en lav, stabil vandskål op og skift vandet dagligt.

LYS OG UVB

Lacerta trilineata soler sig meget og kræver kraftigt lys og UVB. Udendørs kommer UVB fra solen.

FODER

Lacerta trilineata er først og fremmest insektæder, men tager også snegle, små firben og jævnligt frugt og blomster.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Lacerta trilineata er sky og hurtig. Hannerne forsvarer deres territorium kraftigt, og et underlegent dyr kan ikke undgå en stærkere han i et terrarie.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Nordmakedonien, Bulgarien, Serbien, Grækenland, Kroatien, Montenegro, Bosnien-Hercegovina og Albanien.