herpy

FIRBEN

Erhard's Wall Lizard

Podarcis erhardii

Podarcis erhardii er et mellemstort, dagaktivt klippefirben fra Grækenland og de omkringliggende lande, især de ægæiske øer. Det bliver 15-23 cm inklusive hale, er grå, brun eller grønlig med meget varierende tegning, og lever af leddyr. Arten er almindelig i naturen, men der findes kun lidt viden om pasningen.

Familie: Lacertidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**15-23 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Klippeboende og jordboende**
Biotop	**Klippeterræn og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**100 × 50 × 50 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-30 °C**
Hotspot	**40-45 °C**
Temperatur, nat	**14-18 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 3
Vinterhvile	**8-12 °C** 8-12 uger
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-4 æg**
Kuld pr. år	**1-2**
Inkubation	**35-45 dage** ved 26-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES eller i EU's bilag A-D og er ikke blandt de arter, private ikke må holde efter BEK nr. 1261 af 17.11.2015. Arten står på bilag IV i EU's habitatdirektiv. Efter artsfredningsbekendtgørelsen (BEK nr. 521/2021, § 11) må dyr indsamlet i naturen derfor ikke holdes, handles, overdrages eller udstilles i Danmark. Opdrættet afkom af lovligt erhvervede dyr er undtaget (§ 2), men ejeren skal kunne godtgøre, at dyret ikke stammer fra naturen (§ 20).

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Podarcis erhardii*. Tallene for temperatur, fugt, UVB, levetid og rugning er derfor lånt fra *Podarcis muralis* og *Podarcis siculus*, som har samme levevis og et lignende klima.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 22-30 °C, og solpladsen skal være 40-45 °C ved overfladen, målt med et infrarødt termometer. Brug en spot over en flad sten, og varm kun en del af terrariet op, så dyrene selv kan vælge.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være moderat: 40-60 % om dagen. Terrariet skal kunne tørre helt ud, for stillestående fugtig luft giver hudproblemer og svamp.
LYS OG UVB	*Podarcis erhardii* er dagaktiv og lever i åbent, solbeskinnet terræn, så terrariet skal have kraftig varme og UVB-lys. Arten hører formentlig til Ferguson-zone 3, med UV-indeks omkring 3-5 ved solpladsen.
FODER	*Podarcis erhardii* æder mest små leddyr. Foderdyrene kan være fårekyllinger, små græshopper, fluer, bananfluer, springhaler, edderkopper og bænkebidere, og melorme og vokslarver kun i små mængder.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Podarcis erhardii* er hurtig og opmærksom og flygter ved forstyrrelse. Hannerne er territoriale, og to hanner sammen giver kamp.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Grækenland, Albanien, Nordmakedonien og Bulgarien.