herpy

FIRBEN

Asian Grass Lizard

Takydromus sexlineatus

Takydromus sexlineatus er et slankt, dagaktivt firben med en usædvanligt lang hale, der lever i højt græs og lav bevoksning i Sydøstasien. Det bliver 20-30 cm, hvoraf langt det meste er hale, og lever af små insekter. Arten er tropisk og skal ikke i vinterhvile, men den tørrer hurtigt ud og kræver en høj, tæt beplantet indretning med moderat fugtighed.

Familie: Lacertidae Udgivet 17. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**20-30 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-7 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Savanne**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 40 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Hotspot	**34-40 °C**
Temperatur, nat	**20-23 °C**
Luftfugtighed	**60-70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter**
Holdes	**Parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-4 æg**
Kuld pr. år	**2-5**
Inkubation	**40 dage** ved 26 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES eller i EU's handelsbilag og er ikke blandt de arter, private ikke må holde efter BEK nr. 1261 af 17.11.2015.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Et lille glasterrarie er for lidt til *Takydromus sexlineatus*, selv om dyret er lille. Et par skal have mindst 60 × 40 × 60 cm (længde × bredde × højde), og en han med to hunner mindst 90 × 60 × 60 cm.

TEMPERATUR

Gradienten er det vigtigste. Dagtemperaturen er 25-30 °C, og på solpladsen er overfladen 34-40 °C, målt med et infrarødt termometer. Det passer til den kropstemperatur på 28-34 °C, dyrene selv vælger.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden skal være 60-70 %. Sprøjt terrariet med vand to gange om dagen, så dyrene kan drikke dråber fra bladene og væggene, og så luftfugtigheden holdes oppe.

LYS OG UVB

Takydromus sexlineatus er dagaktiv. Terrariet skal have en lille varmespot og UVB-lys. UVB-lampen skal give Ferguson-zone 2 (UV-indeks omkring 1-3 ved solpladsen) og sidde over en gren eller sten, som dyrene soler sig på.

FODER

Takydromus sexlineatus er insektæder og tager små levende insekter. Maden er små fårekyllinger, fluer, bananfluer, springhaler, melorme, voksmøllarver, små græshopper og små kakerlakker.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Takydromus sexlineatus er hurtigt, sky og et dyr til iagttagelse. Det skal ikke tages op: halen kan kastes ved fangst og gror kun delvis tilbage med en anden struktur, og dyrene er så hurtige, at de let undslipper.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Indien, Kina, Myanmar (Burma), Thailand, Laos, Cambodja, Vietnam, Malaysia og Indonesien.