herpy

FIRBEN

North African Ocellated Lizard

Timon pater

Timon pater er et stort, dagaktivt firben fra det nordlige Algeriet og Tunesien og en nær slægtning til det europæiske *Timon lepidus*. Pasningen bygger på *T. lepidus* og *Timon tangitanus*: et stort terrarie, kraftig varme og UVB, en kølig vinterhvile og gerne et udendørs terrarie om sommeren.

Familie: Lacertidae Tidligere navn: *Lacerta lepida pater*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**40-60 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**17 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Klippeboende, jordboende og gravende**
Biotop	**Klippeterræn og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-30 °C**
Hotspot	**35-50 °C**
Temperatur, nat	**15-20 °C**
Luftfugtighed	**40-70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Vinterhvile	**8-15 °C** 6-8 uger
Kost	**Insekter og frugt**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**10-16 æg**
Kuld pr. år	**1-2**
Inkubation	**78-96 dage** ved 26 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført i CITES eller i EU's bilag A-D og står ikke på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015). Køb kun opdrættede dyr, og spørg sælger om dokumentation for herkomsten.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes kun lidt viden om pasningen af *Timon pater*, og tallene her er lånt fra de nærtstående *Timon lepidus* og *Timon tangitanus*, som er bedre kendt i fangenskab.

TEMPERATUR
Solpladsen skal have en overfladetemperatur på 35-50 °C, målt med et infrarødt termometer. Luften i resten af terrariet holdes på 22-30 °C om dagen, og temperaturen falder til 15-20 °C om natten.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luften i terrariet skal være forholdsvis tør, 40-70 %, men dyrene skal altid kunne søge en fugtig hule. Hold bunden tør øverst og fugtig længere nede.

LYS OG UVB
Timon pater er dagaktiv og soler sig i flere timer, så terrariet skal have meget lys og kraftig UVB. Brug et T5 HO-rør på 10-12 % i et armatur med reflektor over solpladsen eller en kviksølvdamplampe.

FODER
I naturen består føden mest af biller og myrer, til tider også snegle og græshopper. Giv fårekyllinger, græshopper, kakerlakker, melorme og zophobas i varierende størrelser.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Opførslen hos *Timon pater* er ikke dokumenteret, så det følgende er lånt fra slægtens øvrige arter. Dyrene er nysgerrige og kan tage føde fra en pincet. Giv et nyt dyr et par uger i ro, og lad det selv komme til.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Algeriet og Tunesien.