herpy

FIRBEN

Four-lined Tegu

Tupinambis quadrilineatus

Tupinambis quadrilineatus er en mellemstor, dagaktiv tegu fra Cerrado-savannerne i det centrale Brasilien, kendt på de fire lange længdestriber langs kroppen. Pasningen er næsten udokumenteret, og arten er sjælden i handlen. Tallene i vejledningen er lånt fra slægtningene i *Tupinambis* og *Salvator*: et stort, varmt terrarie med dyb bund, UVB og en erfaren holder.

Familie: Teiidae Tidligere navn: *Tupinambis cerradensis*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**23-27 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Savanne**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**180 × 90 × 90 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-35 °C**
Hotspot	**40-55 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**60-75 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**4-32 æg**
Inkubation	**150-180 dage** ved 28-32 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag B (forordning 338/97) som en del af *Tupinambis* spp. Handel over grænser kræver derfor CITES- og EU-dokumenter, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Ingen teguer står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015). Spørg sælger om dokumentation for dyrets herkomst.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes næsten ingen viden om pasningen af *Tupinambis quadrilineatus*, og opdræt i fangenskab er ikke dokumenteret. Klimaet i udbredelsesområdet er varmt og savanneagtigt med tydelig regntid og tørtid.
TEMPERATUR	Solpladsen skal have en overfladetemperatur på 40-55 °C, målt med et infrarødt termometer. Den varme ende af terrariet er 32-35 °C og den kølige 24-29 °C. Om natten slukkes lys og varme, og temperaturen falder til 20-24 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden er sat til 60-75 %, et skøn ud fra savanneklimaet, som er tørrere end regnskovens; teguerne fra Amazonas holdes ved 70-85 %.
LYS OG UVB	*Tupinambis quadrilineatus* er dagaktiv og skal have kraftigt lys og UVB 12 timer om dagen. Teguerne hører til Ferguson-zone 3, og tallet er lånt fra slægtningene.
FODER	Hvad *Tupinambis quadrilineatus* æder i naturen, er ikke dokumenteret. Slægtens arter lever af en bred kost med mest dyrisk føde, og tallene her er lånt fra dem.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Der findes ingen oplysninger om temperamentet hos *Tupinambis quadrilineatus*.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Brasilien.