herpy

FIRBEN

Skovfirben

Zootoca vivipara

Zootoca vivipara er et lille, dagaktivt firben, der lever længere mod nord end noget andet krybdyr. Arten bliver omkring 15 cm og holder til på moser, heder, skovbryn og enge. I det meste af udbredelsen føder hunnen levende unger. Den kræver et køligt, solrigt og fugtigt terrarie med mange skjul og en vinterhvile på tre til fire måneder.

Familie: Lacertidae Engelsk: European Common Lizard Udgivet 17. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**12-16 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**2-5 g**
Levetid	**5-12 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Vådområde og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**80 × 50 × 50 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-28 °C**
Hotspot	**32-38 °C**
Temperatur, nat	**14-18 °C**
Luftfugtighed	**50-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Vinterhvile	**4-6 °C** 12-16 uger
Kost	**Insekter**
Holdes	**Parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kønsmoden	**12-36 mdr.**
Kuldstørrelse	**2-12 unger**
Kuld pr. år	**1**
Drægtighed	**35-85 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Fredet i Danmark (BEK nr. 521 af 25.3.2021, bilag 1, ændret ved BEK nr. 1005 af 2.7.2025; administreres af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø): vildtlevende dyr må ikke fanges eller dræbes. Hjemmehørende dyr fra naturen må ikke tages til terrarium. Arten står ikke på CITES eller i EU's handelsbilag. Opdrættet afkom af lovligt erhvervede dyr er undtaget (§ 2 nr. 2), men ejeren skal kunne godtgøre oprindelsen (§ 20).

Pasning i korte træk

TERRARIET	*Zootoca vivipara* trives bedst udendørs i en indhegning eller et lukket havebed i fuld sol med skyggefulde, kølige zoner.
TEMPERATUR	*Zootoca vivipara* er en art fra kolde egne, men den soler sig meget og holder kropstemperaturen omkring 30-33 °C, når den er aktiv.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	*Zootoca vivipara* lever i fugtige områder, og luftfugtigheden i terrariet er 50-60 % om dagen og 70-80 % om natten. Der skal være en tørrere og en fugtigere zone, så dyret selv kan vælge.
LYS OG UVB	*Zootoca vivipara* er dagaktivt og soler sig meget, så det har brug for sollys eller UVB. Udendørs kommer UVB fra solen. Indendørs bruges et UVB-rør over solpladsen, så UV-indekset er omkring 1-3 ved dyrets hoved.
FODER	*Zootoca vivipara* er insektæder. I naturen består kosten af fluer, edderkopper, sommerfuglelarver, bladlus og andre små leddyr, og hunner æder mere end hanner. Dyret æder mest på solrige dage.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Zootoca vivipara* er et sky, hurtigt og vagtsomt dyr. Hannerne er territoriale over for andre hanner og kan bide hunnen i parringstiden.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Irland, Storbritannien, Norge, Sverige, Finland, Danmark, Nederlandene, Belgien, Luxembourg, Frankrig, Spanien, Andorra, Tyskland, Schweiz, Liechtenstein, Østrig, Italien, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro, Nordmakedonien, Albanien, Grækenland, Bulgarien, Rumænien, Ungarn, Slovakiet, Tjekkiet, Polen, Litauen, Letland, Estland, Belarus, Ukraine, Rusland, Kasakhstan, Mongoliet, Kina og Japan.