herpy

FRØER

Blue-sided Treefrog

Agalychnis annae

Agalychnis annae er en 6-8 cm stor løvfrø fra bjergskovene i Costa Rica: grøn på ryggen, med orange øjne og himmelblå sider og lår. Den er nataktiv, lever højt oppe i vegetationen og er sårbar i naturen. Arten kræver et køligt og luftigt terrarie: om dagen 20-24 °C og forholdsvis tør luft, og først om aftenen forstøves der kraftigt.

Familie: Phyllomedusidae Tidligere navn: *Phyllomedusa annae*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**6-8 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, nat	**15-18 °C**
Luftfugtighed	**50-75 %**
Vand	**Vandskål** dybde 2-3 cm
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Ægglægning	**På blade over vand**
Æg pr. lægning	**47-162**
Klækning	**5-8 dage** ved 22-24 °C
Larvetid	**60-250 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Hele slægten Agalychnis står på CITES liste II, så handel over EU's grænser kræver CITES-tilladelser, og du bør kunne dokumentere, at dyrene er opdrættede. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Der findes kun lidt direkte pasningsviden om *Agalychnis annae*, og tallene her er derfor delvis lånt fra *Agalychnis moreletii*, som lever i samme højde og i samme type bjergskov og har de samme krav.

TEMPERATUR

Agalychnis annae kommer fra højere beliggende skove end de mere kendte løvfrøer og tåler ikke varme i længere tid. Om dagen skal der være 20-24 °C, og temperaturen bør ikke komme over 25 °C, heller ikke kortvarigt.

LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING

Luftfugtigheden holdes på 50-75 % om dagen, mens frøerne sover. Om aftenen, når lyset slukker, forstøves terrariet kraftigt, så luftfugtigheden stiger til 80-100 % og falder igen i løbet af natten.

VAND OG VANDKVALITET

Der skal altid stå en skål med rent vand i terrariet. En skål på omkring 20 cm i diameter med 2-3 cm vand er nok, og frøerne skal let kunne komme op igen; glatte sten i skålen forhindrer, at mindre dyr drukner.

LYS OG UVB

UVB anbefales, fordi D-vitamin er nødvendigt for kalkomsætningen, og insekter indeholder næsten intet. Ferguson-zone 3 er lånt fra *Agalychnis moreletii*: et gennemsnitligt UV-indeks på 1-2,6 på de steder, hvor frøerne hviler.

FODER

Agalychnis annae æder kun insekter. Brune fårekyllinger er det bedste basisfoder, når de er fodret op med næringsrigt foder et par dage, før frøerne får dem. Også kakerlakker, voksmøllarver og stuefluer (og deres larver) tages.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Agalychnis annae sover om dagen på blade og er aktiv om natten. Den bevæger sig langsomt og klatrer hånd over hånd, men springer langt, når den bliver skræmt, så åbn terrariet forsigtigt.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Costa Rica.