herpy

FRØER

Rødøjet løvfrø

Agalychnis callidryas

Agalychnis callidryas er en af terrariehobbyens mest genkendelige frøer: bladgrøn med knaldrøde øjne, orange fødder og blå og gule sider. Den sover om dagen under et blad og vågner først, når lyset slukkes. Med stabil varme, høj luftfugtighed og et højt, tæt beplantet terrarie er den en taknemmelig frø at se på, men ikke at håndtere.

Familie: Phyllomedusidae Engelsk: Red-eyed Treefrog Udgivet 15. november 2026 **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**4-8 cm** snude-kloak-længde
Vægt	**6-15 g**
Levetid	**4-8 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Øvet**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**På blade over vand**
Kønsmoden	**12-24 mdr.**
Æg pr. lægning	**10-100**
Klækning	**6-8 dage**
Larvetid	**35-60 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter, færdigfoder og andre haletudser**
Yngelpleje	**Ingen**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Temperatur, nat	**20-22 °C**
Luftfugtighed	**60-90 %**
Vand	**Vandskål** dybde 2-3 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Hele slægten Agalychnis står på CITES liste II, så handel over EU's grænser kræver CITES-tilladelser, og du bør kunne dokumentere, at dyrene er opdrættede. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET	*Agalychnis callidryas* udnytter højden, så terrariet skal være højt og have mange store blade at sove på. Et par voksne dyr kan holdes i 45 × 45 × 60 cm.
TEMPERATUR	Hold terrariet på 24-28 °C om dagen og 20-22 °C om natten. Andre angivelser er 24-29 °C om dagen med et fald på 3-5 °C om natten. Terrarier uden planter bliver let et par grader varmere end beplantede. Der er ingen vinterhvile.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal ligge på 60-90 %. Én sprøjtning om dagen giver omkring 60-80 %, og overbrusning 1-2 gange dagligt giver 80-90 %. Sprøjt gerne om aftenen, når frøerne vågner, og lad terrariet tørre lidt op i løbet af dagen.
VAND OG VANDKVALITET	Stil en stabil, lav vandskål i terrariet. 2-3 cm vand er nok, så frøen let kan komme op igen. Frøen drikker ikke meget, men optager vand gennem huden.
LYS OG UVB	Giv 10-12 timers lys om dagen, først og fremmest til planterne. Arten har ikke brug for andet lys end det, planterne kræver, men et lavt niveau af UVB kan gives, hvis det er muligt.
FODER	Hovedfoderet er insekter i passende størrelse: fårekyllinger, stuefluer, spyfluer og møl. Foderdyret må højst være så stort som afstanden mellem frøens øjne.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Agalychnis callidryas* er strengt nataktiv og rolig. Om dagen ser man ofte kun en grøn klump under et blad med lukkede øjne, og det er helt normalt.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Mexico, Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama og Colombia.