herpy

FRØER

Black-eyed Leaf Frog

Agalychnis moreletii

Agalychnis moreletii er en 6-9 cm stor løvfrø fra bjergskovene i Mexico og Mellemamerika: grøn på ryggen, med dybsorte øjne og orange sider og lår. Den er nataktiv og lever højt oppe i træerne. Den kræver køligere og tørrere forhold end de fleste slægtninge: om dagen skal terrariet være tørt og under 24 °C, og først om aftenen forstøves det fugtigt.

Familie: Phyllomedusidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**6-9 cm** snude-kloak-længde
Vægt	**6-25 g**
Levetid	**5-11 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Hotspot	**25 °C**
Temperatur, nat	**15-18 °C**
Luftfugtighed	**50-70 %**
Vand	**Vandskål** dybde 2-3 cm
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Ægglægning	**På blade over vand**
Æg pr. lægning	**23-334**
Klækning	**7-11 dage** ved 20-24 °C
Larvetid	**60-100 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Hele slægten Agalychnis står på CITES liste II, så handel over EU's grænser kræver CITES-tilladelser, og du bør kunne dokumentere, at dyrene er opdrættede. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Agalychnis moreletii lever i træerne, så højden er vigtigere end gulvarealet. Et terrarie på mindst 45 × 45 × 60 cm rummer en lille gruppe på fire dyr.

TEMPERATUR

Agalychnis moreletii er en bjergart og skal holdes køligere end den mere kendte *Agalychnis callidryas*. Om dagen skal der være 20-24 °C.

LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING

Tør luft om dagen er afgørende for *Agalychnis moreletii*. Luftfugtigheden holdes på 50-70 % om dagen, mens frøerne sover, uden for yngletiden gerne omkring 60 %.

VAND OG VANDKVALITET

Der skal altid stå en skål med rent vand i terrariet. En skål på omkring 20 cm i diameter med 2-3 cm vand er nok, og frøerne skal let kunne komme op igen.

LYS OG UVB

UVB anbefales, fordi D-vitamin er nødvendigt for kalkomsætningen, og insekter indeholder næsten intet.

FODER

Agalychnis moreletii æder kun insekter. Brune fårekyllinger (*Acheta domesticus*) er det bedste basisfoder, når de er fodret op med næringsrigt foder, fx frugt, grøntsager og revet gulerod, i 48 timer, før frøerne får dem.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Agalychnis moreletii sover om dagen på blade og er aktiv om natten. Den bevæger sig langsomt og klatrer hånd over hånd, men springer langt, når den bliver skræmt, så åbn terrariet forsigtigt.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Mexico, Belize, Guatemala, Honduras og El Salvador.