herpy

FRØER

Gliding Leaf Frog

Agalychnis spurrelli

Agalychnis spurrelli er en 5-9 cm stor løvfrø fra de fugtige lavlandsskove i Costa Rica, Panama, Colombia og Ecuador: grøn på ryggen med hvide pletter, orange sider og en mørkerød regnbue i øjet. Den er nataktiv, bor højt i træerne og kan glide fra gren til gren på sin store svømmehud. I terrariet er den hårdfør og yngler let, når terrariet holdes rent og tørrer op om dagen.

Familie: Phyllomedusidae Tidligere navn: *Agalychnis litodryas*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**5-9 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift	**Ingen kendt**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 45 × 60 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-27 °C**
Temperatur, nat	**20-23 °C**
Luftfugtighed	**65-75 %**
Vand	**Vandskål** dybde 2-3 cm
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**På blade over vand**
Kønsmoden	**12-18 mdr.**
Æg pr. lægning	**30-110**
Klækning	**7-9 dage** ved 24-26 °C
Larvetid	**42-63 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Hele slægten Agalychnis står på CITES liste II, så handel over EU's grænser kræver CITES-tilladelser, og du bør kunne dokumentere, at dyrene er opdrættede. EU-bilaget er ikke aflæst i referencetabellen og er derfor ikke angivet.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Agalychnis spurrelli bor højt oppe i vegetationen, så terrariets højde og antallet af grene er vigtigere end gulvarealet. Et terrarie på mindst 60 × 45 × 60 cm rummer en lille gruppe på fire dyr.

TEMPERATUR

Om dagen holdes terrariet på 22-27 °C, og om natten må temperaturen falde 3-5 °C til 20-23 °C. Der er ikke brug for et varmt hotspot: en let opvarmning af rummet eller en varemåtte på siden af terrariet er nok.

LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING

Luftfugtigheden holdes på 65-75 % uden for yngletiden. Terrariet forstøves kraftigt om aftenen, kort før lyset slukkes, så luftfugtigheden stiger til 80-100 % i nogle timer og falder igen i løbet af natten og dagen.

VAND OG VANDKVALITET

Der skal altid stå en stor, lav skål med rent vand i terrariet, hvor frøerne let kan komme op og ned. Vanddybden er 2-3 cm. Frøerne tisser og afføder ofte i vandet, så skålen tømmes, skrubbes og fyldes hver dag.

LYS OG UVB

Terrariet skal have 12 timers lys og 12 timers mørke. Plantelys af LED eller lysstofrør giver planterne det, de skal bruge, og dyrene en tydelig dag.

FODER

Agalychnis spurrelli æder levende insekter. Brune fårekyllinger i passende størrelse er basisfoder, suppleret med fx kakerlakker, voksmøllarver og stuefluer.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Agalychnis spurrelli er rolig og nataktiv. Hannerne er ikke aggressive over for hinanden uden for yngletiden, og flere hanner og begge køn kan holdes sammen, så længe der er plads nok.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Costa Rica, Panama, Colombia og Ecuador.