herpy

FRØER

Large-webbed Bell Toad

Bombina maxima

Bombina maxima er den største art i slægten: en kraftig, gråbrun og stærkt vortet frø på 6-8 cm med en orange bug, marmoreret med sort, som den viser frem, når den føler sig truet. Den kommer fra bjergene i Sydvestkina og vil have rent, køligt vand og et køligt terrarie. Den er let at passe, når temperaturen holdes nede, men stiller større krav til vandkvaliteten end *Bombina orientalis*.

Familie: Bombinatoridae Tidligere navn: *Bombinator maximus* **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**6-8 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**6-15 år**
Aktiv	**Dag og skumring**
Levevis	**Semi-akvatisk**
Biotop	**Vådområde og tempereret skov og eng**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**80 × 40 × 40 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**18-23 °C**
Temperatur, nat	**12-17 °C**
Luftfugtighed	**60-85 %**
Vand	**Akvaterrarie** dybde 5-10 cm
UVB	**Valgfri**
Vinterhvile	**4-8 °C** 8-12 uger
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**I gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudser i vand**
Æglægning	**I vand**
Kønsmoden	**24-36 mdr.**
Æg pr. lægning	**20-150**
Klækning	**3-10 dage** ved 18-22 °C
Larvetid	**30-90 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES, så der kræves ingen CITES-papirer. Sæt aldrig dyr ud i den danske natur: de kan bære chytridsvamp og krydse sig med den hjemmehørende *Bombina bombina*.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Arten skal have et akvaterrarie, hvor omkring to tredjedele af bundfladen er vand og en tredjedel land. Fire voksne dyr skal have mindst 80 × 40 × 40 cm.

TEMPERATUR
Arten kommer fra køligt højland og skal holdes køligere end de fleste frøer. Om dagen er 18-23 °C passende, og temperaturen bør aldrig komme over 25 °C. Om natten må det gerne falde til 12-17 °C.

LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING
Luftfugtigheden skal ligge på 60-85 %. Den store vanddel gør det meste af arbejdet, så det er nok at forstøve landdelen let en gang om dagen.

VAND OG VANDKVALITET
Vandet skal være 5-10 cm dybt, og dyrene skal altid let kunne komme op, fx ad skrå rødder, flade sten eller planter. Vandet har samme temperatur som rummet og skal ikke opvarmes.

LYS OG UVB
Giv 12 timers lys om dagen i sommerhalvåret og lidt kortere dage om vinteren, styret af et tænd-sluk-ur. En LED-armatur med dagslysspektrum giver nok lys til planterne.

FODER
Foderet skal bevæge sig. Giv almindelige foderinsekter i passende størrelse: fårekyllinger, fluer, bænkebidere, regnorme og små snegle. Melorme er fede og gives kun en gang imellem.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Arten er aktiv om dagen og i skumringen og ses ofte åbent fremme, på land eller flydende i overfladen. Den holdes bedst i gruppe. I yngletiden bliver der livligt, når hannerne kalder fra vandet.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Kina.